herpy

SKINKER

Centralian Blue-Tongued Lizard

Tiliqua multifasciata

En kraftig skink fra Australiens tørre indre med en bred, lysegrå til lysebrun krop og talrige orangebrune tværbånd fra nakke til halespids. *Tiliqua multifasciata* har et stort hoved, en sort stribe bag øjet og en blå tunge, og den kræver et stort, tørt terrarie med varme og UVB.

Familie: Scincidae Tidligere navn: *Tiliqua occipitalis multifasciata* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**40-45 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-20 år**
Aktiv	**Dag og skumring**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Ørken og halvørken**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**150 × 60 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-29 °C**
Hotspot	**37-40 °C**
Temperatur, nat	**18-24 °C**
Luftfugtighed	**20-40 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, frugt, planter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kuldstørrelse	**2-10 unger**
Kuld pr. år	**1**
Drægtighed	**90-120 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste III og bilag C i EU's forordning om handel med vilde dyr. Dyr skal være lovligt erhvervet, og dokumentation for oprindelsen skal følge dyret. Ingen skinker er forbudt at holde i Danmark efter bekendtgørelsen om dyr, der ikke må holdes af private.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Tiliqua multifasciata*.
TEMPERATUR	Terrariet skal have en tydelig gradient. Solpladsen under en spotlampe skal have en overfladetemperatur på 37-40 °C, og den kølige ende skal holdes på 21-29 °C. Om natten slukkes lyset, og temperaturen må falde til 18-24 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Arten kommer fra tørre egne og trives ved en luftfugtighed på 20-40 %. Hold bunden tør og ventilationen god, for vedvarende fugt i bunden kan give svampeinfektioner på bug og fødder.
LYS OG UVB	Arten lever i stærkt sollys, så terrariet skal have kraftigt lys og UVB 8-12 timer om dagen. Giv UVB svarende til Ferguson-zone 3 med et UV-indeks på omkring 3 på solpladsen.
FODER	*Tiliqua multifasciata* er altædende og æder i naturen en stor andel planteføde: frø og plantedele, men også insekter og ådsler. I fangenskab skal kosten være alsidig.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er rolig og stedfast og vænner sig til forsigtig håndtering, men er ikke et dyr, der skal bæres rundt. Et truet dyr hvæser med åben mund og viser den blå tunge. Løft altid under bugen, og støt hele kroppen.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.