herpy

SKINKER

Blotched Blue-Tongued Lizard

Tiliqua nigrolutea

Tiliqua nigrolutea er en kraftig, tungtbygget skink fra det sydøstlige Australien med bred blå tunge og lyse, uregelmæssige pletter på mørk ryg. Den er dagaktiv og altædende, bliver 35-50 cm lang og kan leve mange år. Arten kommer fra et køligt tempereret klima med en tydelig vinterhvile og skal have et stort terrarie, UVB og en nattesænkning.

Familie: Scincidae Tidligere navn: *Scincus nigroluteus; Cyclodus nigroluteus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**35-55 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-30 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Bjergskov og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**180 × 60 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**21-29 °C**
Hotspot	**37-40 °C**
Temperatur, nat	**18-24 °C**
Luftfugtighed	**40-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, frugt, planter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kuldstørrelse	**5-11 unger**
Drægtighed	**90-150 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste III (af Australien) og i EU's bilag C (forordning 338/97). Dokumentation kræves i praksis kun ved indførsel til EU fra eksportlandet, men køb kun dyr med papirer på den lovlige oprindelse. CITES-myndighed i Danmark er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Ingen skinker står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015).

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 180 × 60 × 60 cm (længde × bredde × højde), svarende til godt 1 m² gulvareal. Større er bedre.

TEMPERATUR
Lufttemperaturen skal ligge på 21-29 °C fra den kølige til den varme ende, og overfladen på solpladsen skal være 37-40 °C, så dyret kan holde kroppen på de 30-35 °C, det foretrækker, når det er aktivt.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal være 40-50 %, målt i den kølige ende. En våd bund er ikke nødvendig, men et skjul med fugtig sphagnum, hvor fugtigheden kommer op mod 100 %, hjælper på hudskiftet.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og skal have både UVB og kraftigt lys. Brug et T5-rør med UVB, og placér det, så UV-indekset på solpladsen er omkring 3-4 (Ferguson-zone 3).

FODER
Tiliqua nigrolutea er altædende. Grundfoderet er en blanding af grønt, dyrisk protein og lidt frugt. Unger under 12 måneder skal have 70-80 % protein, voksne omkring 50-60 %.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Tiliqua nigrolutea er rolig, og dyr fra opdræt bliver ofte tamme. Når du løfter dyret, skal hele kroppen inklusive halen hvile på underarmen, og den ene hånd skal være synlig.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Australien.