herpy

SKINKER

Western Blue-Tongued Lizard

Tiliqua occipitalis

Tiliqua occipitalis er en kraftig, jordlevende skink fra det sydlige og centrale Australien med brune tværbånd over krop og hale og den brede, blå tunge, som kendetegner slægten. Arten bliver omkring 40 cm lang, er dagaktiv og altædende og skal have et stort terrarie med UVB og en varm solplads. Den får levende unger og ses sjældent i fangenskab.

Familie: Scincidae Tidligere navn: *Cyclodus occipitalis; Cyclodus fasciatus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**35-45 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Halvørken og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-32 °C**
Hotspot	**35-45 °C**
Temperatur, nat	**15-22 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, frugt, planter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kuldstørrelse	**5 unger**
Kuld pr. år	**1**
Drægtighed	**90-120 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste III (af Australien) og i EU's bilag C (forordning 338/97). Dokumentation kræves i praksis kun ved indførsel til EU fra eksportlandet, men køb kun dyr med papirer på den lovlige oprindelse. CITES-myndighed i Danmark er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Ingen skinker står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015).

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 120 × 60 × 60 cm (længde × bredde × højde). Det mindste mål, der angives for arten, er 100 × 50 cm til et enkelt dyr, men det er snævert, og større er bedre.
TEMPERATUR	Giv dyret en temperaturgradient fra 22-26 °C i den kølige ende til 28-32 °C i den varme ende. Overfladen på solpladsen skal være 35-45 °C, og dyret skal kunne vælge, hvor varmt det vil ligge.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Arten kommer fra tørre til halvtørre egne og skal ikke have høj luftfugtighed. 30-50 % er passende, målt i den kølige ende. Bunden skal være let fugtig dybere nede, men aldrig våd.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og skal have både UVB og kraftigt lys. Brug et T5-rør med UVB over nettet, og placér det, så UV-indekset på solpladsen er 3-4 (Ferguson-zone 3).
FODER	*Tiliqua occipitalis* er altædende, og føden skal varieres så meget som muligt. Grønt er fx mælkebøtter, hibiscusblomster, tusindfryd, kål og revet squash, og frugt gives i mindre mængder, både blød og hård.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Skinken er sky de første dage, men falder til og tåler rolig håndtering. Løft den med hele kroppen understøttet, så fødderne har noget at stå på, hold den aldrig med bugen opad, og tag aldrig fat i hovedet eller halen.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.