herpy

SKINKER

Grankogleskink

Tiliqua rugosa

En langsom, tungt pansret australsk skink, der ligner en grankogle med en kort, bred hale. *Tiliqua rugosa* har en koboltblå tunge, som den viser frem ved trussel, lever mest af planter og danner par, der holder sammen år efter år. Den kræver solplads, UVB og tørre forhold.

Familie: Scincidae Engelsk: Bobtail Tidligere navn: *Trachydosaurus rugosus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**30-45 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**600-900 g**
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Halvørken og savanne**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**15-29 °C**
Hotspot	**35-40 °C**
Temperatur, nat	**10-20 °C**
Luftfugtighed	**20-40 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, frugt, planter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kuldstørrelse	**1-4 unger**
Kuld pr. år	**1**
Drægtighed	**140-170 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste III og bilag C i EU's forordning om handel med vilde dyr. Dyr skal være lovligt erhvervet, og dokumentation for oprindelsen skal følge dyret. Ingen skinker er forbudt at holde i Danmark efter bekendtgørelsen om dyr, der ikke må holdes af private.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Arten klatrer ikke, så gulvarealet er det vigtigste. Et par skal have mindst 120 × 60 × 45 cm (længde × bredde × højde), og større er bedre. Mindre terrarier på 90-100 × 50-60 cm er kun nok til ét dyr.

TEMPERATUR
Terrariet skal have en tydelig gradient. Den varme ende skal være 27-29 °C, og under en spotlampe skal solpladsen nå 35-40 °C i flere timer om dagen. Angivelserne for den kølige ende svinger fra omkring 15 °C til 21 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Arten kommer fra tørre egne og skal have en luftfugtighed på 20-40 %. Hold bunden tør, og lad ikke vand stå. Tilbyd frisk vand i en meget lav skål, der ikke kan vælte, og som dyret nemt kan komme op af. Tøm og vask skålen jævnligt.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og skal have et UVB-rør tændt 8-12 timer om dagen. Røret skal måles jævnligt eller skiftes mindst hvert halve år, fordi UVB-udstrålingen aftager.

FODER
Tiliqua rugosa er altædende med vægten på planter. Voksne dyr skal have 70-80 % plantekost og kun 20-30 % dyrisk føde.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Arten er rolig og vænner sig til forsigtig håndtering. Nye dyr kan være sky, og nogle går tilbage til hvæs og gaben efter få dage uden kontakt. Hold aldrig dyret på ryggen, og giv altid fødderne noget at stå på.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Australien.