herpy

SKINKER

Blåtungeskink

Tiliqua scincoides

En kraftig, tungtbygget skink fra Australien og det østlige Indonesien med en bred, knaldblå tunge, som den viser frem, når den føler sig truet. *Tiliqua scincoides* er dagaktiv, altædende og rolig, bliver 45-60 cm lang og kan leve omkring 20 år. Den kræver et stort terrarie, UVB og en varm solplads.

Familie: Scincidae Engelsk: Common Blue-tongued Skink Tidligere navn: *Lacerta scincoides* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**45-60 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**400-600 g**
Levetid	**15-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Savanne og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**180 × 60 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**21-33 °C**
Hotspot	**35-45 °C**
Temperatur, nat	**18-24 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, frugt, planter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kønsmoden	**18-36 mdr.**
Kuldstørrelse	**6-15 unger**
Kuld pr. år	**1**
Drægtighed	**90-120 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

De to australske underarter, *T. s. scincoides* og *T. s. intermedia*, står på CITES liste III og på bilag C i EU's forordning om handel med vilde dyr. Listningen nævner ikke den indonesiske underart *T. s. chimaerea* fra Tanimbar, så det er ikke afklaret, om reglerne også gælder for den. Køb dyr med dokumentation for oprindelsen, og kontrollér, hvilken underart det er, fordi formerne forveksles i handlen.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 180 × 60 × 60 cm (længde × bredde × højde), svarende til godt 1 m² gulvareal. Større er bedre, og strengere standarder kræver omkring 180 × 120 × 90 cm.

TEMPERATUR

Dyret skal kunne vælge mellem 21-26 °C i den kølige ende og 28-33 °C i den varme ende. Overfladen på solpladsen skal være 35-45 °C. Angivelserne svinger fra 33-38 °C til 40-46 °C, og den høje ende gælder især *T. scincoides*.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

De australske underarter skal have en luftfugtighed på 40-60 %, målt i den kølige ende. Den indonesiske *T. s. chimaerea* kræver 60-80 %.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og skal have både UVB og kraftigt lys. Brug et T5-rør med UVB, og placér det, så UV-indekset på solpladsen er omkring 3-4 (Ferguson-zone 3).

FODER

Tiliqua scincoides er altædende. Grundfoderet er en blanding af grønt, dyrisk protein og lidt frugt. Unger under 12 måneder skal have 70-80 % protein, voksne omkring 50-60 %.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Tiliqua scincoides er rolig, og dyr fra opdræt bliver ofte meget tamme. Vildfangne dyr er lettere stressede og mere defensive. En skink tæmmes ved at tale roligt til den og lade den komme til dig i sit eget tempo.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Australien og Indonesien.