herpy

SKINKER

African Five-lined Skink

Trachylepis quinquetaeniata

Trachylepis quinquetaeniata er en aktiv, dagaktiv skink fra det nordlige og centrale Afrika med glinsende, metalagtige skæl, lyse længdestriber og en hale, der hos unge dyr og hunner skinner elektrisk blå. Den soler sig på sten og lever af insekter. Den er hurtig og sky, så den egner sig bedst som udstillingsdyr, ikke til håndtering.

Familie: Scincidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**20-25 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**4-5 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Klippeboende og jordboende**
Biotop	**Halvørken, savanne og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Hotspot	**32-35 °C**
Temperatur, nat	**20-22 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**12-15 mdr.**
Kuldstørrelse	**3-10 æg**
Kuld pr. år	**1-2**
Inkubation	**60-62 dage** ved 27-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er hverken opført i CITES eller i EU's bilag A-D, så der kræves ingen CITES-papirer. Den står ikke på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015).

Pasning i korte træk

TERRARIET

Et enkelt dyr skal have et terrarie på mindst 90 × 45 × 45 cm. Arten er hurtig og meget aktiv og bruger al den plads, den får, så større er bedre. En avlsgruppe med én han og to til tre hunner kræver mindst 120 × 60 × 60 cm.

TEMPERATUR

Trachylepis quinquetaeniata er en solelsker. Hold 24-29 °C i den kølige del af terrariet og 32-35 °C på selve solpladsen, målt på overfladen med en digital føler eller et IR-termometer.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Arten kræver en moderat luftfugtighed på 60-80 %, lavere om dagen og højere om natten.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og har brug for stærkt, klart lys og UVB. Arten soler sig i åbent, stenet terræn og hører efter levevisen til Ferguson-zone 3. Brug et T5 HO-UVB-rør på 5-6 % i en reflektor på samme side som varmelampen.

FODER

Arten er insektæder. Giv fårekyllinger, kakerlakker (fx *Blaptica dubia*, *Shelfordella lateralis* og *Blaberus*), silkeorme, små tobakssværmerlarver, melorme, larver af soldaterfluen og snegle, så kosten er så varieret som muligt.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Trachylepis quinquetaeniata er hurtig, nervøs og vagtsom og er et dyr til at se på. Den flygter, taber halen og stresses af gentagen håndtering.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Benin, Burkina Faso, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Congo-Kinshasa, Elfenbenskysten, Djibouti, Egypten, Eritrea, Etiopien, Ghana, Guinea, Kenya, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Somalia, Sydsudan, Sudan, Tanzania, Togo og Uganda.