herpy

SKINKER

Red-Eyed Bush Crocodile Skink

Tribolonotus gracilis

Tribolonotus gracilis er en sky, skumringsaktiv skink fra regnskoven på det nordlige Ny Guinea med en rødorange ring om øjnene og rækker af spidse, bagudbøjede skæl ned ad ryggen, der giver den et pansret, næsten drageagtigt udseende. Den lever skjult i fugtigt skovaffald, kan give lyd fra sig og lægger kun ét æg ad gangen. Den egner sig bedst som udstillingsdyr, ikke til håndtering.

Familie: Scincidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**16-20 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Hotspot	**27-28 °C**
Temperatur, nat	**22-24 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**36-48 mdr.**
Kuldstørrelse	**1 æg**
Kuld pr. år	**1-6**
Inkubation	**65-85 dage** ved 23-27 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Bilag D**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står i bilag D i EU's forordning om handel med vilde dyr (338/97), som er en overvågningsliste. Den er ikke opført i CITES, så der kræves ingen CITES-papirer. Dyr, der indføres fra lande uden for EU, skal anmeldes ved indførslen. Arten står ikke på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015).

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et enkelt dyr skal have et terrarie på mindst 60 × 45 × 45 cm, og større er bedre. Et par skal have mindst 0,3 m² bund, fx 90 × 45 cm.

TEMPERATUR
Tribolonotus gracilis er tropisk, men soler sig ikke i naturen. Hold terrariet på 24-26 °C i den kølige ende og 27-28 °C i et varmt skjul, og lad temperaturen falde til 22-24 °C om natten.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Arten tåler meget dårligt udtørring. Luftfugtigheden skal være 70-80 % om dagen og højere om natten, gerne omkring 90 %, og bunden skal altid være fugtig.

LYS OG UVB
Arten er aktiv i skumringen og om natten, og angivelserne om UVB er uenige. Dyret kan klare sig og yngle uden UVB, når foderet får kalk og D3-vitamin, men et svagt UVB-lys giver de bedste resultater og anbefales.

FODER
Arten er insektæder. Grundfoderet kan være fårekyllinger, kakerlakker (fx *Blaptica dubia* og *Blaberus discoidalis*), melorme, superorme, tobakssværmerlarver, silkeorme, larver af soldaterfluen, regnorme og snegle.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Tribolonotus gracilis er et dyr til at se på og ikke til håndtering. Når den bliver grebet, hviner den, spiller død, prøver at flygte eller smider halen, og det stresser den.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Papua Ny Guinea og Indonesien.