herpy

SKINKER

Spiny Skink

Tribolonotus novaeguineae

Tribolonotus novaeguineae er en lille, sky skink fra lavlandsregnskoven på Ny Guinea med rækker af spidse, bagudbøjede skæl ned ad ryggen. Den lever skjult i fugtigt skovaffald, er mest aktiv i skumringen og lægger kun ét æg ad gangen. Der findes kun lidt viden om pasningen af netop denne art, og den egner sig bedst som udstillingsdyr.

Familie: Scincidae Tidligere navn: *Zonurus novaeguineae* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**16-20 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Hotspot	**27-28 °C**
Temperatur, nat	**22-24 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**36-48 mdr.**
Kuldstørrelse	**1 æg**
Kuld pr. år	**1-6**
Inkubation	**65-85 dage** ved 23-27 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Bilag D**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står i bilag D i EU's forordning om handel med vilde dyr (338/97), som er en overvågningsliste. Den er ikke opført i CITES, så der kræves ingen CITES-papirer, men dyr, der indføres fra lande uden for EU, skal anmeldes ved indførslen. CITES-myndighed i Danmark er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Ingen skinker står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015).

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes kun lidt viden om pasningen af *Tribolonotus novaeguineae*.

TEMPERATUR
Dagtemperaturen skal være 24-27 °C, og et varmt skjul med 27-28 °C holder dyret i gang, selv om det ikke soler sig. Om natten er 22-24 °C passende. Brug en lille varmelampe i keramisk fatning over skjulet, styret af en termostat.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal være 70-90 %, højest om natten, og bunden skal altid være fugtig. Sprøjt terrariet morgen og aften med rent vand (omvendt osmose eller destilleret), og hæv fugtigheden til 85-90 %, hvis dyrene skal yngle.

LYS OG UVB
Arten er aktiv i skumringen og skal ikke have en kraftig solplads, men 12 timers dagslys i døgnet holder døgnrytmen.

FODER
Tribolonotus novaeguineae er insektæder. Grundfoderet er fårekyllinger, kakerlakker, regnorme, melorme og silkeorme, og voksmøllarver og superorme gives i mindre mængder.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Tribolonotus novaeguineae er et dyr til at se på og ikke til håndtering. Når den bliver grebet, kan den give lyd fra sig, spille død, prøve at flygte eller smide halen, og det stresser den.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Indonesien og Papua Ny Guinea.