herpy

SKINKER

Giant Spiny Skink

Tribolonotus ponceleti

Tribolonotus ponceleti er en sjælden, skjult levende skink fra øerne i Salomon-øgruppen og den største art i sin slægt. Den har kølede, tornede skæl og et kantet, pansret hoved, lever i skovbunden og graver sig ned, og den kan give lyd fra sig. Pasningen bygger på klimaet og på de nære slægtninge *Tribolonotus gracilis* og *Tribolonotus novaeguineae*.

Familie: Scincidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**11-13 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**75 × 45 × 45 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Hotspot	**27-28 °C**
Temperatur, nat	**22-24 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1 æg**
Inkubation	**65-85 dage** ved 23-27 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Utilstrækkelige data (DD)**

Arten er ikke opført i CITES eller i EU's bilag A-D, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen skinker står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015).

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes kun meget lidt viden om pasningen af *Tribolonotus ponceleti*. Klimaet i udbredelsesområdet er varmt og fugtigt hele året, og arten lever i skovbundens løv.

TEMPERATUR
Hold terrariet på 24-27 °C i den kølige ende og 27-28 °C i et varmt skjul, og lad temperaturen falde til 22-24 °C om natten. Skinken er aktiv i skumringen og om natten og soler sig næppe, men varmer sig i skjul.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal være 70-80 % om dagen og højere om natten, gerne 80-90 %, og bunden skal altid være fugtig. Arten tåler formentlig meget dårligt udtørring, som de nære slægtninge.

LYS OG UVB
Dyret er aktivt i skumringen og om natten, og behovet for UVB er ikke dokumenteret. Hos de nære slægtninge kan dyrene klare sig uden UVB, når foderet får kalk og D3-vitamin, men et svagt UVB-lys anbefales.

FODER
Arten æder leddyr i naturen. Grundfoderet kan være fårekyllinger, kakerlakker, melorme, silkeorme, larver af soldaterfluen, regnorme og snegle. Variation er vigtig, og regnorme får som regel et skjult dyr frem.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Tribolonotus ponceleti er et dyr til at se på og ikke til håndtering. Skinker i slægten spiller død, prøver at flygte, smider halen eller giver lyd fra sig, når de bliver grebet, og det stresser dem.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Salomonøerne og Papua Ny Guinea.