herpy

SKINKER

False Poncelet's Helmet Skink

Tribolonotus pseudoponceleti

Tribolonotus pseudoponceleti er en lille, hemmelighedsfuld skink fra Bougainville og Buka i den nordlige del af Salomon-øgruppen. Den har kølede, ru skæl og et trekantet hoved og lever under rådne stammer, som regel i par. Pasningen er næsten ikke beskrevet og bygger derfor på artens levevis i naturen og på de nære slægtninge *Tribolonotus gracilis* og *Tribolonotus novaeguineae*.

Familie: Scincidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**4-7 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 40 × 30 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Hotspot	**27-28 °C**
Temperatur, nat	**22-24 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1 æg**
Inkubation	**65-85 dage** ved 23-27 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført i CITES eller i EU's bilag A-D, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen skinker står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015).

Pasning i korte træk

TERRARIET	Pasningen af *Tribolonotus pseudoponceleti* er næsten ikke beskrevet. Arten lever i et varmt og fugtigt klima og skjuler sig under rådne stammer.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 24-27 °C i den kølige ende og 27-28 °C i et varmt skjul, og om natten 22-24 °C. Arten viser sig ikke i det åbne og soler sig ikke, men varmer sig under stammer og bark.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være 70-80 % om dagen og 80-90 % om natten, og bunden skal altid være fugtig, men ikke drivvåd; arten foretrækker fugtige, men ikke vandmættede steder.
LYS OG UVB	Behovet for UVB er ikke dokumenteret. De nære slægtninge kan klare sig uden UVB, når foderet får kalk og D3-vitamin, men et svagt UVB-lys anbefales.
FODER	Arten æder små leddyr, i fangenskab også termitter. Grundfoderet kan være små fårekyllinger, kakerlakker, melorme, silkeorme, larver af soldaterfluen, regnorme og små snegle. Variation er vigtig.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Tribolonotus pseudoponceleti* er et dyr til at se på og ikke til håndtering. Bliver den afdækket, trykker den sig fladt mod jorden og bliver liggende eller kravler langsomt væk; den forsøger sjældent at flygte.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Papua Ny Guinea.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/skinker/tribolonotus-pseudoponceleti