herpy

SKINKER

Schmidt's Crocodile Skink

Tribolonotus schmidti

Tribolonotus schmidti er en lille, sky skink fra Guadalcanal på Salomonøerne med to rækker pladeformede skæl ned ad ryggen. Den lever skjult i det fugtige løvlag på skovbunden og føder levende unger, ét ad gangen, i modsætning til de to bedre kendte slægtninge, som lægger æg.

Familie: Scincidae Tidligere navn: *Pediporus schmidti* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**9-10 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**8-10 år**
Aktiv	**Dag og skumring**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Hotspot	**27-28 °C**
Temperatur, nat	**22-24 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kuldstørrelse	**1 unger**
Drægtighed	**65-85 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført i CITES eller i EU's forordning om handel med vilde dyr (338/97), så der kræves ingen CITES-papirer. Den står ikke på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015).

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Tribolonotus schmidti*. Arten lever i varm, fugtig skov på Guadalcanal og må formodes at have de samme krav som de nære slægtninge *Tribolonotus gracilis* og *Tribolonotus novaeguineae*.
TEMPERATUR	Hold terrariet til *Tribolonotus schmidti* på 24-27 °C om dagen, med et varmt skjul på 27-28 °C, og lad temperaturen falde til 22-24 °C om natten.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Til *Tribolonotus schmidti* skal luftfugtigheden være 70-90 %, og bunden skal altid være fugtig.
LYS OG UVB	*Tribolonotus schmidti* sover om natten og er formentlig aktiv om dagen og i skumringen i det skyggefulde løvlag. UVB er ikke dokumenteret for arten, men et svagt UVB-lys (Ferguson-zone 1) anbefales efter slægtningene.
FODER	*Tribolonotus schmidti* er insektæder. Grundfoderet kan være fårekyllinger, kakerlakker, melorme, små larver og regnorme. Snegle og orme kan tilbydes som variation. Unge dyr fodres hver dag, voksne hver anden dag.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Tribolonotus schmidti* er en sky skink, der lever skjult, og som er et dyr til at se på og ikke til håndtering. Slægten kan give lyde fra sig, men det er ikke dokumenteret for arten. Giv et nyt dyr mindst to uger i fred.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Salomonøerne.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/skinker/tribolonotus-schmidti