herpy

SKINKER

Schmidt's Crocodile Skink

Tribolonotus schmidti

Tribolonotus schmidti er en lille, sky skink fra Guadalcanal på Salomonøerne med to rækker pladeformede skæl ned ad ryggen. Den lever skjult i det fugtige løvlag på skovbunden og føder levende unger, ét ad gangen, i modsætning til de to bedre kendte slægtninge, som lægger æg.

Familie: Scincidae Tidligere navn: *Pediporus schmidti* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**9-10 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**8-10 år**
Aktiv	**Dag og skumring**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Hotspot	**27-28 °C**
Temperatur, nat	**22-24 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kuldstørrelse	**1 unger**
Drægtighed	**65-85 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført i CITES eller i EU's forordning om handel med vilde dyr (338/97), så der kræves ingen CITES-papirer. Den står ikke på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015).

Om arten

Tribolonotus schmidti er en lille, kraftigt bygget skink med trekantet hoved og korte ben. Midt ned ad ryggen løber to rækker forstørrede, pladeformede skæl med over 20 skæl i hver række fra nakken til halen, og de giver den et pansret, drageagtigt udseende. Slægten har særlige porer under fødderne. Farver og tegninger er ikke beskrevet detaljeret for arten.

Kroppen fra snude til kloak er op til 4 cm, og typeeksemplaret måler knap 9 cm inklusive hale. Voksne dyr er altså omkring 9-10 cm lange, og arten er en af de mindste i slægten.

Arten blev beskrevet i 1930 af Charles Burt og er opkaldt efter herpetologen Karl Patterson Schmidt. Den adskiller sig fra de bedre kendte slægtninge ved at føde levende unger.

Udbredelse og levested

Tribolonotus schmidti lever kun på Guadalcanal, den største af Salomonøerne. Typelokaliteten er Marapa Island (tidligere Beagle Island) i Marau Sound i den østlige del af øen. En ældre angivelse fra Bougainville er sandsynligvis en forveksling med en anden art i slægten.

> **Oprindelig udbredelse:** Salomonøerne.

LEVESTED

Tribolonotus schmidti lever i skov på Guadalcanal fra havniveau op til omkring 1.500 m. Den lever skjult i løvlaget på skovbunden under nedfaldne blade, grene og andet affald, og den sover om natten. Klimaet er tropisk og fugtigt hele året, køligere i bjergene end ved kysten. Temperaturer og skjulesteder er ikke beskrevet nærmere for arten.

Pasning

TERRARIET

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Tribolonotus schmidti*. Arten lever i varm, fugtig skov på Guadalcanal og må formodes at have de samme krav som de nære slægtninge *Tribolonotus gracilis* og *Tribolonotus novaeguineae*. Tallene i vejledningen er lånt fra dem.

Et enkelt voksent dyr skal have et terrarie på mindst 60 × 45 × 45 cm, og større er bedre. Brug en dyb, fugtig bund af muldjord og kokosfiber i et lag på 5-10 cm med et tykt lag nedfaldne blade ovenpå. Indret med mange skjul som kokosskaller, korkrør og buede stykker korkbark, så dyret selv kan vælge. Et terrarie med frontåbning er roligere end et, der åbnes fra oven. Ventilationen skal være god, så luften ikke bliver stillestående og muggen. Fjern ekskrementer dagligt, og skift bunden helt hver 3.-4. måned.

TEMPERATUR

Hold terrariet til *Tribolonotus schmidti* på 24-27 °C om dagen, med et varmt skjul på 27-28 °C, og lad temperaturen falde til 22-24 °C om natten. Arten lever i skygge og soler sig næppe, så varmen skal komme fra et skjul under en svag varmepære på 50-60 W med keramisk fatning ved den ene ende. Bliver skjulet for varmt, så skift til en svagere pære. Mål temperaturen i skjulet med en digital føler eller styr den med termostat. Er stuen koldere end 22 °C om natten, kan et keramisk varmelegeme på termostat bruges.

Læs mere: Varme og temperatur

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Til *Tribolonotus schmidti* skal luftfugtigheden være 70-90 %, og bunden skal altid være fugtig. Sprøjt terrariet morgen og aften, eller brug et automatisk regnanlæg, og hold god ventilation, så terrariet tørrer lidt op mellem sprøjtningerne. Slægten tåler udtørring dårligt. Stil en skål med rent vand, der er gravet delvist ned i bunden, til drikkevand og bad, og skift vandet dagligt.

Læs mere: Luftfugtighed, sprøjtning og ventilation

LYS OG UVB

Tribolonotus schmidti sover om natten og er formentlig aktiv om dagen og i skumringen i det skyggefulde løvlag. UVB er ikke dokumenteret for arten, men et svagt UVB-lys (Ferguson-zone 1) anbefales efter slægtningene. Brug et T5-rør til skovarter i skygge, og lad det dække halvdelen af terrariets længde. UV-indekset skal være 1-2 på det højeste sted. Der skal være masser af skygge og skjul. Hold lyset tændt 12 timer i døgnet, så dag og nat er adskilt, og skift røret hver 12. måned.

Læs mere: Lys og UVB

FODER

Tribolonotus schmidti er insektæder. Grundfoderet kan være fårekyllinger, kakerlakker, melorme, små larver og regnorme. Snegle og orme kan tilbydes som variation. Unge dyr fodres hver dag, voksne hver anden dag. Byttedyrene må højst være halvt så store som dyrets hoved. Drys insekterne med kalk ved hver fodring og med D3-vitamin og multivitamin ved hver anden. Der skal altid stå en skål med frisk vand.

Læs mere: Foderdyr: hold og avl Læs mere: Kalk, vitaminer og tilskud

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Tribolonotus schmidti er en sky skink, der lever skjult, og som er et dyr til at se på og ikke til håndtering. Slægten kan give lyde fra sig, men det er ikke dokumenteret for arten. Giv et nyt dyr mindst to uger i fred. Dyr af samme køn kan være aggressive over for hinanden, så arten holdes enkeltvis eller som et par i et rummeligt terrarie med mange skjul.

Avl

KØNSMODENHED OG KØNSBESTEMMELSE

Kønsmodenhed og kønsforskelle er ikke dokumenteret for *Tribolonotus schmidti*. Hos slægten har hannerne forstørrede skæl og porer under bagfødderne, som kan ses med en lup.

PARRING

Avl af *Tribolonotus schmidti* i terrarier er ikke dokumenteret. Slægtningene yngler, når et par sættes sammen i et rummeligt, fugtigt terrarie med mange skjul. Parret deler ofte skjul.

ÆGLÆGNING OG KULD

Tribolonotus schmidti føder levende unger, i modsætning til de bedre kendte slægtninge, som lægger æg. Æggene udvikles i hunnen, og der fødes én unge ad gangen. Hvor mange kuld hunnen får om året, er ikke dokumenteret. Giv en drægtig hun mange skjul og stabil fugtighed.

INKUBATION

Der er ingen æg at udruge, fordi ungen fødes levende. Drægtighedens længde er ikke dokumenteret for *Tribolonotus schmidti*. De 65-85 dage i boksen svarer til æggenes udviklingstid hos *Tribolonotus gracilis* og er kun et groft skøn.

OPDRÆT AF UNGER

Opdræt er ikke dokumenteret for arten. Ungerne antages at ligne de voksne og kan fodres som hos slægtningene: små fårekyllinger og andre små insekter hver dag, drysset med kalk og D3-vitamin, i en lav kasse med fugtigt køkkenrulle eller mos, en kokosskal som skjul og en lav vandskål.

Sundhed og typiske fejl

Der vides næsten intet om sygdomme hos arten, og for slægten er viden begrænset. Typiske problemer og forebyggelse:

- Parasitter hos nyindkøbte, vildfangne dyr. Hold nye dyr i karantæne enkeltvis og få en afføringsprøve undersøgt hos en dyrlæge med erfaring i krybdyr.
- Bakterieinfektioner hos stressede dyr efter transport og kulde.
- Udtørring. Matte øjne og slap krop er tegn på for lidt fugt.
- Knoglesvind ved for lidt kalk og D3-vitamin.
- Tabt hale ved forskrækkelse eller håndtering.

Et sundt dyr er årvågent, har klare, blanke øjne og ingen sår. Søg dyrlæge, hvis dyret taber sig, ikke æder eller ligger sløvt hen.

Læs mere: Karantæne og hygiejne Læs mere: Køb af dyr: opdræt, vildfang og transport

Spørg altid dine kloge bekendte

Vejledningen er et godt sted at begynde, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskellige, og meget af det vigtigste lærer man af dem, der har holdt arten i årevis. Tal med en avler, en erfaren holder eller en dyrlæge med forstand på krybdyr og padder, før du anskaffer dyret - og igen, hvis noget ser forkert ud.