herpy

SLANGER

Spotted Python

Antaresia maculosa

Antaresia maculosa er en lille, natlig pyton fra Australiens østkyst. Den bliver oftest 90-130 cm, er rolig og hårdfør, æder villigt og hører til de bedst egnede pytoner for nye slangeholdere. Mønstret er mørke, flossede pletter på lysebrun bund. Den er dygtig til at slippe ud af terrarier, der ikke er helt tætte.

Familie: Pythonidae Tidligere navn: *Liasis maculosus; Antaresia maculosus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**90-130 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**20-30 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Savanne, regnskov og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Hotspot	**32-35 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**20-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**18-36 mdr.**
Kuldstørrelse	**6-15 æg**
Inkubation	**50-60 dage** ved 31-32 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i bilag B i EU's forordning 338/97 (familielistningen Pythonidae spp.). Indførsel fra lande uden for EU kræver CITES-tilladelse, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) efter BEK nr. 1588 af 9.12.2024. Arten er ikke omfattet af forbudslisten for slanger i BEK nr. 1261 af 17.11.2015. Dyrevelfærdslovens almindelige krav gælder; dyrevelfærd hører også under SGAV.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Antaresia maculosa passes som de nære slægtninge *Antaresia childreni* og *Antaresia stimsoni*, som har samme levevis og krav. Enkelte tal, især for avlen, er lånt fra dem.

TEMPERATUR

Terrariet skal have en tydelig gradient. Solpletten og det varme skjul skal være 32-35 °C. Den kølige side skal være 24-29 °C. Om natten skal temperaturen være 20-24 °C og må ikke i længere tid ligge under 20 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

A. maculosa er ikke kræsen med luftfugtigheden og tåler 20-80 %. Dårlige hudskifter skyldes oftest forkert temperatur, ikke forkert luftfugtighed. Luftfugtigheden er højest på den kølige side og om natten og lavest ved varmen.

LYS OG UVB

Arten er natlig, men skal have en fast dag-nat-rytme. Lyset tændes 12 timer om dagen om sommeren og skrues ned til omkring 10 timer om vinteren, styret af et ur.

FODER

Antaresia maculosa spiser mus og små rotter af en størrelse, der passer til slangen. Byttet skal være optøet og varmet til 32-38 °C i en pose i varmt vand. Brug en fodringspincet med bløde spidser, fordi slangen slår hårdt til.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

A. maculosa er rolig, har en kraftig fodringsrefleks og tåler håndtering godt. Unge dyr er mere nervøse og kan bide eller rejse sig og slå, men de vænner sig til håndtering.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Australien.