herpy

SLANGER

Kongeboa

Boa constrictor

Boa constrictor er en kraftig boa fra Sydamerika, især øst for Andesbjergene, brun til grå med mørke sadelmærker og en hale, der hos mange lokalformer er rødbrun til rød. Den bliver 180-300 cm, er aktiv i skumringen og om natten og lever 20-30 år. Den er større end den nærtbeslægtede *Boa imperator*, kræver et stort terrarie, sjældne måltider og en holder, der kan tage ansvar i årtier.

Familie: Boidae Engelsk: Boa Constrictor Tidligere navn: *Constrictor constrictor* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**180-300 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**20-30 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Savanne, tørskov og regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**240 × 120 × 120 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-30 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**55-75 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kønsmoden	**18-48 mdr.**
Kuldstørrelse	**10-65 unger**
Drægtighed	**100-120 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er omfattet af CITES liste II og EU's bilag B (forordning 338/97). Underarten *B. c. occidentalis* står på CITES liste I og i bilag A. Indførsel fra lande uden for EU kræver CITES-tilladelse fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) efter BEK nr. 1588 af 9.12.2024. Arten er ikke blandt de store kvælerslanger, som private ikke må holde i Danmark (BEK nr. 1261 af 17.11.2015). Spørg sælger om dokumentation for oprindelsen; *Boa imperator* sælges ofte under dette navn.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et voksent dyr over 240 cm skal have et terrarie på mindst 240 × 120 × 120 cm (længde × bredde × højde), og mindre voksne dyr på 180-240 cm mindst 180 × 90 × 90 cm.

TEMPERATUR
Der skal være en gradient fra kold til varm. Luften ved solpladsen skal være 30-32 °C og den kolde ende 24-26 °C, og hele terrariet bør rumme zoner mellem 24 og 32 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal ligge på 55-75 % og svinge lidt. Kortvarigt over 70 % skader ikke, hvis terrariet får lov at tørre ud, mens vedvarende fugt giver skimmel. Før hudskifte kan 75-85 % hjælpe dyret med at skifte i ét stykke.

LYS OG UVB
Arten er nataktiv og har ikke brug for kraftigt lys, men UVB anbefales. Den hører til Ferguson-zone 2: lejlighedsvis solbader. Målet er et UV-indeks på 2-3 ved solpladsen.

FODER
B. constrictor er en kødæder og skal have hele byttedyr. Unge dyr får mus og små rotter, og voksne dyr får rotter, unge kaniner, marsvin, kyllinger og vagtler. Variation er sund.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
B. constrictor er en klog, individuel slange. Nogle dyr tåler og kan lide håndtering, andre vil helst have fred. Unger og unge dyr er ofte nervøse og kan hvæse og bide. Konsekvent, blid håndtering gør dem rolige.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Colombia, Venezuela, Guyana, Fransk Guyana, Surinam, Ecuador, Peru, Bolivia, Brasilien, Paraguay, Argentina og Trinidad og Tobago.