herpy

SLANGER

Brown House Snake

Boaedon capensis

Boaedon capensis er en slank, natlig kvælerslange fra det sydlige Afrika, hvor den lever i krat, græsland og omkring menneskers huse og jager gnavere og firben. I terrariet er den hårdfør og enkel at passe, og voksne dyr bliver som regel rolige i hånden, men arten er en dygtig flugtkunstner, og unger er hurtige.

Familie: Lamprophiidae Tidligere navn: *Lamprophis capensis; Boaedon capense*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**60-120 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Halvørken og savanne**
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**90 × 45 × 40 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**5-16 æg**
Kuld pr. år	**1-4**
Inkubation	**55-65 dage** ved 29-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES-listerne eller i bilagene til EU's forordning 338/97, står ikke på EU's liste over invasive arter og er ikke omfattet af forbudslisten for slanger i BEK nr. 1261 af 17.11.2015. Der gælder kun dyrevelfærdslovens almindelige krav. Dyrevelfærd hører under Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV).

Pasning i korte træk

TERRARIET	En voksen *B. capensis* skal have et terrarie på mindst 90 × 45 × 40 cm. Større er altid bedre, og store hunner trives i 100 × 50 × 40 cm.
TEMPERATUR	Terrariet skal have en tydelig temperaturgradient. Om dagen er der 24-28 °C, med omkring 24 °C i den kølige ende. Det varmeste sted, hvor slangen kan ligge og varme sig, skal være 30-32 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal ligge på 40-60 %. Det opnås i de fleste stuer med en vandskål, og det er sjældent nødvendigt at forstøve.
LYS OG UVB	*B. capensis* er natlig og har ikke brug for stærkt lys. En fast lysrytme på omkring 12 timer lys og 12 timer mørke året rundt giver en klar døgnrytme. UVB er ikke nødvendigt for dyr, der får hele byttedyr.
FODER	*Boaedon capensis* kvæler sit bytte, har en kraftig fodringsrefleks og æder som regel villigt. Den fodres med hele, optøede mus og for store hunners vedkommende små rotter, aldrig med levende byttedyr.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Unger og halvvoksne kan være hurtige, bidske og urolige, og de kan springe ud af terrariet som en udløst fjeder, når låget åbnes. Åbn derfor låget forsigtigt over et sikkert sted.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Sydafrika, Lesotho, Eswatini, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Zambia og Malawi.