herpy

SLANGER

African Brown House Snake

Boaedon fuliginosus

Boaedon fuliginosus er en lille, slank og natlig kvælerslange fra Vestafrikas savanner, hvor den ofte lever tæt på menneskers huse og æder alt fra firben til gnavere. Dyrene i handlen er hårdføre og bliver som regel rolige som voksne, men de har en meget ivrig fodringsrefleks og er dygtige flugtkunstnere.

Familie: Lamprophiidae Tidligere navn: *Lamprophis fuliginosus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**60-120 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Savanne**
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**90 × 45 × 40 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**5-16 æg**
Kuld pr. år	**1-4**
Inkubation	**55-65 dage** ved 29-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES-listerne eller i bilagene til EU's forordning 338/97, står ikke på EU's liste over invasive arter og er ikke omfattet af forbudslisten for slanger i BEK nr. 1261 af 17.11.2015. Der gælder kun dyrevelfærdslovens almindelige krav. Dyrevelfærd hører under Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV).

Pasning i korte træk

TERRARIET

En voksen *B. fuliginosus* skal have et terrarie på mindst 90 × 45 × 40 cm. Større er altid bedre, og store hunner trives i 100 × 50 × 40 cm.

TEMPERATUR

Terrariet skal have en tydelig temperaturgradient. Om dagen er der 24-28 °C i terrariet, med omkring 24 °C i den kølige ende. Det varmeste sted, hvor slangen kan ligge og varme sig, skal være 30-32 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden skal ligge på 40-60 %. Det opnås i de fleste stuer med en vandskål, og det er sjældent nødvendigt at forstøve.

LYS OG UVB

B. fuliginosus er natlig og har ikke brug for stærkt lys. En fast lysrytme på omkring 12 timer lys og 12 timer mørke året rundt giver en klar døgnrytme.

FODER

Boaedon fuliginosus kvæler sit bytte, har en kraftig fodringsrefleks og æder næsten altid. Den fodres med hele, optøede mus eller små rotter, aldrig med levende byttedyr.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Unger og halvvoksne kan være hurtige, bidske og urolige, og de kan springe ud af terrariet som en udløst fjeder, når låget åbnes. Åbn derfor låget forsigtigt over et sikkert sted.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Mauretanien, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskysten, Burkina Faso, Mali, Ghana, Togo, Benin, Niger, Nigeria, Cameroun, Tchad og Den Centralafrikanske Republik.