herpy

SLANGER

Pacific Ground Boa

Candoia carinata

Candoia carinata er en lille, slank boa med kølede skæl og gribehale fra skove i Indonesien, Ny Guinea og Bismarckarkipelaget. Den bliver 45-60 cm, er nataktiv og æder firben og frøer, når den er ung, senere også gnavere. Den føder levende unger og passes i et lille, varmt og fugtigt terrarie med grene og en vandskål.

Familie: Boidae Tidligere navn: *Boa carinata; Enygrus carinatus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**45-60 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Tørskov og regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**80 × 40 × 50 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**26-28 °C**
Temperatur, nat	**24-26 °C**
Luftfugtighed	**50-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Ikke nødvendig**
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kuldstørrelse	**5-15 unger**
Drægtighed	**210-270 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i bilag B i EU's forordning 338/97 (familielistningen Boidae spp.). Indførsel fra lande uden for EU kræver CITES-tilladelse, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) efter BEK nr. 1588 af 9.12.2024. Arten er ikke omfattet af forbudslisten for slanger i BEK nr. 1261 af 17.11.2015. Dyrevelfærdslovens almindelige krav gælder; dyrevelfærd hører også under SGAV.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes kun lidt viden om pasningen af *Candoia carinata*, så anbefalingerne bygger også på erfaringer fra andre arter i slægten *Candoia*.

TEMPERATUR
Om dagen skal der være 26-28 °C, varmest i den ene ende, så slangen kan vælge, og om natten 24-26 °C. Et særligt varmt sted er ikke nødvendigt: slægten søger ikke høj varme, og mange dyr holder sig væk fra varmekilden.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal ligge på 50-80 %. Hold bunden let fugtig, og forstøv terrariet en eller to gange om ugen og oftere, når slangen skal skifte hud. Voksne dyr skifter typisk hud omkring tre gange om året.

LYS OG UVB
Arten er nataktiv og skal have en fast dag-nat-rytme med 12 timers lys og 12 timers mørke styret af et tænd-sluk-ur. Terrariet skal ikke være stærkt oplyst.

FODER
Voksne *Candoia carinata* fodres med én passende stor gnaver hver 3.-4. uge. Arten er ikke særlig aktiv og har et langsomt stofskifte.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Candoia carinata er stille og tilbringer dagen skjult. Opdrættede dyr er normalt rolige og bider sjældent; vildfangne dyr kan være gnavne.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Indonesien og Papua Ny Guinea.