herpy

SLANGER

Amazon Basin Emerald Tree Boa

Corallus batesii

Corallus batesii er en slank, trælevende boa fra Amazonbækkenet. Voksne dyr er mørkegrønne med hvide tegninger og gul bug, ungerne rødorange. Hunnerne bliver omkring 195 cm, og de største dyr nærmer sig 270 cm. Arten blev i 2009 skilt ud fra *Corallus caninus*, som i dag kun omfatter bestandene på Guyana-skjoldet. Den kræver et stort, højt og fugtigt terrarie og en erfaren holder.

Familie: Boidae Tidligere navn: *Chrysenis batesii* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**120-270 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-20 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**180 × 60 × 120 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Hotspot	**30-33 °C**
Temperatur, nat	**22-26 °C**
Luftfugtighed	**65-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kønsmoden	**36-60 mdr.**
Kuldstørrelse	**5-25 unger**
Drægtighed	**180-210 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er omfattet af CITES liste II og EU's bilag B (forordning 338/97) som en del af Boidae spp. Indførsel fra lande uden for EU kræver CITES-tilladelse, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) efter BEK nr. 1588 af 9.12.2024. Arten er ikke blandt de store kvælerslanger, som private ikke må holde i Danmark (BEK nr. 1261 af 17.11.2015). Spørg sælger om dokumentation for dyrets lovlige oprindelse.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 180 × 60 × 120 cm (længde × bredde × højde), og større og især højere er bedre, da *Corallus batesii* bliver større end *C. caninus*.
TEMPERATUR	*Corallus batesii* skal have en jævn varme i hele terrariet og en tydelig solplads. Solpladsen, en vandret gren under varmekilden, skal være 30-33 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være høj og stabil, og 65-80 % er et godt udgangspunkt. Angivelserne svinger fra 65-75 % for *Corallus batesii* til 75-90 % for *C. caninus*.
LYS OG UVB	Arten er nataktiv og kan klare sig uden UVB, men et svagt UVB-lys giver en tydeligere døgnrytme og sikrer D3-vitamin. Arten hører til Ferguson-zone 2, med et UV-indeks på omkring 2-3 ved solpladsen.
FODER	*Corallus batesii* skal have hele byttedyr. Rotter er det bedste foder, fra rottehvalpe på 4-6 g til unger og op til mellemstore rotter på omkring 175 g til voksne.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Corallus batesii* er som regel rolig om dagen og mere fredelig end *C. caninus*, men den er ikke et dyr til hyppig håndtering, og unge dyr er ofte nervøse og forsvarsberedte.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Brasilien, Peru, Bolivia, Ecuador og Colombia.