herpy

SLANGER

Grøn træboa

Corallus caninus

Corallus caninus er en slank, trælevende boa fra Guyana-skjoldet i Sydamerika. Voksne dyr er lysegrønne med hvide tegninger, ungerne rødorange. Arten bliver omkring 120-200 cm. Siden 2009 dækker navnet kun bestandene nord for Amazonfloden, mens Amazonbækkenets dyr hører til *Corallus batesii*. Arten kræver et stort, højt og fugtigt terrarie og en erfaren holder.

Familie: Boidae Engelsk: Emerald Tree Boa Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**120-200 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-20 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**180 × 60 × 120 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Hotspot	**29-32 °C**
Temperatur, nat	**22-25 °C**
Luftfugtighed	**75-90 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kønsmoden	**36-60 mdr.**
Kuldstørrelse	**5-20 unger**
Drægtighed	**180-210 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er omfattet af CITES liste II og EU's bilag B (forordning 338/97) som en del af Boidae spp. Indførsel fra lande uden for EU kræver CITES-tilladelse, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) efter BEK nr. 1588 af 9.12.2024. Arten er ikke blandt de store kvælerslanger, som private ikke må holde i Danmark (BEK nr. 1261 af 17.11.2015). Spørg sælger om dokumentation for dyrets lovlige oprindelse.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 180 × 60 × 120 cm (længde × bredde × højde), og større og især højere er bedre.
TEMPERATUR	*Corallus caninus* skal have en jævn varme i hele terrariet og en tydelig solplads. Solpladsen, en vandret gren under varmekilden, skal være 29-32 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være høj og stabil: 75-90 %. Angivelserne svinger fra 65-75 % til 75-90 %, men arten tåler svingende fugt dårligt, og stabiliteten er vigtigere end det præcise tal.
LYS OG UVB	Arten er nataktiv og kan klare sig uden UVB, men et svagt UVB-lys giver en tydeligere døgnrytme og sikrer D3-vitamin. Arten hører til Ferguson-zone 2, med et UV-indeks på omkring 2-3 ved solpladsen.
FODER	*Corallus caninus* skal have hele byttedyr: mus, rotter, hamstere, gerbiler, vagtler og kyllinger, og rotter er det bedste foder.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Corallus caninus* er ofte nervøs og forsvarsberedt, især som ung, og er ikke et dyr til hyppig håndtering. Føler den sig truet, lægger den sig i en S-formet stilling og hugger. De meget lange fortænder giver dybe sår.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Guyana, Surinam, Fransk Guyana, Venezuela og Brasilien.