herpy

SLANGER

Amazon Tree Boa

Corallus hortulana

Corallus hortulana er en slank, træboende boa fra Amazonas og Guyanaregionen. Den bliver 120-190 cm, findes i mange farver og lurer om natten på sit bytte fra en gren. Den er ofte forsvarsberedt og passer bedst til en øvet holder med plads til et stort terrarie.

Familie: Boidae Tidligere navn: *Corallus hortulanus; Corallus enydris*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**120-190 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-20 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Savanne, tørskov og regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 90 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-29 °C**
Hotspot	**31-34 °C**
Temperatur, nat	**21-24 °C**
Luftfugtighed	**40-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 2
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kønsmoden	**36-48 mdr.**
Kuldstørrelse	**2-29 unger**
Kuld pr. år	**1**
Drægtighed	**180-240 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES bilag II og i EU's forordning 338/97 på bilag B (alle Boidae er listet samlet). Indførsel fra lande uden for EU kræver CITES-dokumenter, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) efter BEK nr. 1588 af 9.12.2024. Arten er ikke omfattet af forbudslisten for slanger i BEK nr. 1261 af 17.11.2015. Spørg sælger om dokumentation for dyrets lovlige oprindelse.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Et voksent *Corallus hortulana* skal have et terrarie på mindst 120 × 60 × 90 cm (længde × bredde × højde). Arten er aktiv og går mest vandret mellem grenene, så gulvarealet er vigtigere end højden.

TEMPERATUR

Om dagen skal temperaturen i terrariet være 27-29 °C. Over en gren i den ene ende skal en varmelampe give en solplads på 31-34 °C, som slangen bruger nogle timer om dagen. Drægtige hunner og dyr, der har ædt, ligger ofte længe her.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Corallus hortulana kommer fra et tropisk klima, og luftfugtigheden skal være 40-70 %, højest om natten og lavere i løbet af dagen, når varmen tørrer luften. Hæv den lidt under hudskifte.

LYS OG UVB

Corallus hortulana er nataktiv, og UVB er ikke nødvendigt. Et svagt UVB-lys (zone 2, UV-indeks på omkring 2-3 ved solpladsen) kan støtte døgnrytmen, men tallet er lånt fra *Corallus caninus*.

FODER

Corallus hortulana æder gnavere, og de fleste tager mus fra første dag. Giv frosne og optøede byttedyr på en lang pincet, ikke levende. Byttet må højst være 20 % bredere end slangens krop på det bredeste sted.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Corallus hortulana er ofte nervøs og forsvarsberedt og ikke et dyr til hyppig håndtering. Slangen kan nå mindst halvdelen af sin kropslængde, når den slår ud, og de lange tænder giver dybe sår.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Fransk Guyana, Brasilien, Ecuador, Peru og Bolivia.