herpy

SLANGER

Kenyan Sand Boa

Eryx colubrinus

Eryx colubrinus er en lille, kraftigt bygget boa fra Østafrikas tørre områder, der tilbringer det meste af tiden gravet ned i sand med kun de opadvendte øjne over overfladen. Den er rolig, kræver ikke meget plads og kan blive 20-30 år gammel, så den er et godt valg til den, der vil have sin første slange.

Familie: Boidae Tidligere navn: *Gongylophis colubrinus; Eryx thebaicus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**40-65 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**20-30 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Ørken og halvørken**
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 30 × 30 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**26-28 °C**
Hotspot	**33-35 °C**
Temperatur, nat	**22-25 °C**
Luftfugtighed	**20-40 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kuldstørrelse	**10-20 unger**
Kuld pr. år	**1**
Drægtighed	**120-180 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES bilag II og i EU's forordning 338/97 på bilag B (alle Boidae er listet samlet). Indførsel fra lande uden for EU kræver CITES-dokumenter, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) efter BEK nr. 1588 af 9.12.2024. Arten er ikke omfattet af forbudslisten for slanger i BEK nr. 1261 af 17.11.2015. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET

En voksen *Eryx colubrinus* skal have et terrarie på mindst 60 × 30 × 30 cm (længde × bredde × højde), gerne 90 × 45 × 45 cm. Hunner, der er større end gennemsnittet, skal have mere end minimum.

TEMPERATUR

Eryx colubrinus tåler tørre, varme forhold. Der skal være en varm og en kølig ende. Overfladen under varmekilden skal være 33-35 °C, og den kølige ende 26-28 °C. Om natten må temperaturen falde til 22-25 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Eryx colubrinus lever i et tørt klima, og terrariet skal være tørt det meste af tiden. Luftfugtigheden ligger bedst omkring 20-40 %; tallet er et skøn ud fra levestedet. Et hygrometer viser, om terrariet bliver for fugtigt.

LYS OG UVB

Eryx colubrinus er mest aktiv i skumringen og om natten og kan leve uden UVB, men et svagt UVB-rør anbefales, fordi det støtter døgnrytmen og dækker behovet for D3-vitamin.

FODER

Eryx colubrinus er kødæder og tager hele byttedyr. Grundfoderet er mus: voksne hunner kan tage en stor voksen mus, voksne hanner en stor hoppermus.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Eryx colubrinus er rolig og bider sjældent. Lad nye dyr falde til i to uger og begynd først håndtering, når de spiser regelmæssigt.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Egypten, Sudan, Sydsudan, Etiopien, Eritrea, Kenya, Tanzania og Somalia.