herpy

SLANGER

## Rough-scaled Sand Boa

# *Eryx conicus*

*Eryx conicus* er en lille, kraftigt bygget sandboa fra det tørre Sydasien. Den ligger nedgravet i løs jord med kun øjne og snude over overfladen og venter på bytte. Hunnen bliver næsten dobbelt så lang som hannen. Arten er rolig og hårdfør, føder levende unger og egner sig til en begynder, selv om nogle dyr er kræsne med foderet.

Familie: Boidae  Tidligere navn: *Gongylophis conicus*

### SPECIFIKATIONER

#### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **45-95 cm**<br>total længde inkl. hale |
| Levetid | **15-20 år** |
| Aktiv | **Skumring og nat** |
| Levevis | **Jordboende og gravende** |
| Biotop | **Halvørken og tørskov** |
| Sværhedsgrad | **Begynder** |

#### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **75 × 40 × 30 cm**<br>L × B × H til 1 voksent dyr |
| Temperatur, dag | **26-28 °C** |
| Hotspot | **30-32 °C** |
| Temperatur, nat | **22-26 °C** |
| Luftfugtighed | **50-65 %** |
| Vand | **Vandskål** |
| UVB | **Valgfri** |
| Kost | **Hvirveldyr** |
| Holdes | **Enkeltvis** |

#### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Levendefødende** |
| Kuldstørrelse | **7-12 unger** |
| Kuld pr. år | **1** |
| Drægtighed | **120-150 dage** |

#### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Appendiks II** |
| EU-bilag | **Bilag B** |
| IUCN | **Næsten truet (NT)** |

Arten står på CITES liste II og i bilag B i EU's forordning 338/97 (Boidae spp.). Dyret skal kunne dokumenteres lovligt erhvervet, og indførsel fra lande uden for EU kræver CITES-tilladelse, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) efter BEK nr. 1588 af 9.12.2024. Arten står ikke på forbudslisten for slanger i BEK nr. 1261 af 17.11.2015; ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

## Pasning i korte træk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 75 × 40 × 30 cm (længde × bredde × højde); store hunner, der nærmer sig 90 cm, skal have 90 × 45 × 30 cm. Arten bruger næsten ingen højde, så gulvarealet er det, der tæller. |
| **TEMPERATUR** | *Eryx conicus* har brug for en varm og en kølig ende. Varmepladsen skal være 30-32 °C, og resten af terrariet skal være 26-28 °C om dagen. |
| **LUFTFUGTIGHED OG VAND** | Arten kommer fra tørre egne, men luftfugtigheden skal ligge på 50-65 %, så hudskiftet går godt. Bunden skal være tør; fugten kommer fra luften og fra et fugtigt skjul. Et hygrometer viser, om tallet holder. |
| **LYS OG UVB** | Arten er mest aktiv i skumringen og om natten. |
| **FODER** | *Eryx conicus* tager hele byttedyr. Grundfoderet er mus. Giv helst optøede byttedyr, ikke levende, da bytte kan bide og skade slangen. Optøet bytte tages lettere, hvis det bevæges med en lang pincet. |
| **ADFÆRD OG HÅNDTERING** | *E. conicus* er rolig og hårdfør og bider sjældent. Lad nye dyr falde til i to uger, og start først håndtering, når de æder regelmæssigt. Hold de første omgange korte, og støt hele kroppen. |
| **OPRINDELIG UDBREDELSE** | Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka. |