herpy

SLANGER

Javelin Sand Boa

Eryx jaculus

Eryx jaculus er en lille, kraftigt bygget sandboa, som en af de få boaer, der lever vildt i Europa. Den graver sig ned i løs jord i tørre, åbne landskaber fra Balkan og Middelhavsøerne til Nordafrika og Mellemøsten og klarer sig i et enkelt, tørt terrarie med et dybt gravelag.

Familie: Boidae Tidligere navn: *Eryx turcicus; Boa turcica*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**40-80 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-25 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Halvørken**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**75 × 40 × 30 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-28 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri**
Vinterhvile	**14-18 °C** 8-12 uger
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kuldstørrelse	**4-15 unger**
Drægtighed	**120 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag A**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II (Boidae spp.) og som egen art i EU's bilag A, så køb, salg og udstilling som udgangspunkt kræver et EU-certifikat (forordning 338/97, art. 8 og 10). Arten står på bilag IV i habitatdirektivet: efter BEK nr. 521/2021, § 11, må dyr indsamlet i naturen ikke holdes, handles eller udstilles i Danmark. Opdrættet afkom af lovligt erhvervede dyr er undtaget (§ 2), men oprindelsen skal kunne godtgøres (§ 20). Kontakt SGAV, før du skaffer dyr. Arten står ikke på forbudslisten i BEK nr. 1261 af 17.11.2015.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Der findes kun lidt dokumenteret viden om pasningen af *Eryx jaculus*. Anbefalingerne bygger på pasningen af andre sandboaer i slægten, især *Eryx miliaris*, som er den nærmeste og bedst kendte art, og tallene er lånt derfra.

TEMPERATUR

Varmen kommer nedefra. Læg en varmetape eller varmemåtte under højst en fjerdedel af gulvet i den ene ende, styret af en termostat, så bunden i den varme ende er 30-32 °C. En drægtig hun skal have 32-35 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Eryx jaculus lever i et tørt klima, og terrariet skal være tørt. Luftfugtigheden ligger bedst på 30-50 %; tallet er et skøn ud fra levestedet. Skift vandet i skålen jævnligt.

LYS OG UVB

UVB er ikke dokumenteret som nødvendigt for *E. jaculus*, og arten tilbringer det meste af tiden skjult. Et svagt UVB-rør kan bruges som tilbud, hvis der samtidig er rigeligt med skjul.

FODER

Eryx jaculus tager hele byttedyr. Grundfoderet er små mus, helst nyfødte eller halvvoksne, fordi sandboaer foretrækker bytte, der ikke er meget tykkere end dem selv. Giv helst optøede byttedyr, ikke levende.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Eryx jaculus er en skjult, rolig slange, der bruger det meste af tiden nedgravet. Den bider meget sjældent og bruger i stedet de forsvarsstillinger, der står under beskrivelsen.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Marokko, Algeriet, Tunesien, Libyen, Egypten, Israel, De palæstinensiske områder, Syrien, Jordan, Saudi-Arabien, Tyrkiet, Irak, Iran, Grækenland, Bulgarien, Rumænien, Albanien, Nordmakedonien, Italien, Georgien, Armenien, Aserbajdsjan og Rusland.