herpy

SLANGER

Indian Sand Boa

Eryx johnii

Eryx johnii er en lille, kraftigt bygget sandboa fra det tørre Sydasien. Den tilbringer det meste af tiden nedgravet i løs jord, ofte med den stumpe hale, der ligner et hoved, som eneste synlige del. Den er rolig, bider sjældent og kræver ikke meget plads, så den passer godt som første slange.

Familie: Boidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**50-90 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**20-30 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Halvørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 30 × 30 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**26-28 °C**
Hotspot	**32-35 °C**
Temperatur, nat	**22-25 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kuldstørrelse	**4-14 unger**
Kuld pr. år	**1**
Drægtighed	**120-180 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Næsten truet (NT)**

Arten står på CITES liste II og i bilag B i EU's forordning 338/97 (Boidae spp.). Dyret skal kunne dokumenteres lovligt erhvervet, og indførsel fra lande uden for EU kræver CITES-tilladelse, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) efter BEK nr. 1588 af 9.12.2024. Arten står ikke på forbudslisten for slanger i BEK nr. 1261 af 17.11.2015; ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET
En voksen *Eryx johnii* skal have et terrarie på mindst 60 × 30 × 30 cm (længde × bredde × højde). Arten bruger næsten ingen højde, så gulvarealet er det, der tæller; en stor hun skal have et større terrarie.

TEMPERATUR
Eryx johnii har brug for en varm og en kølig ende. Sandet på den varme plads skal være 32-35 °C og i den kølige ende 24-28 °C. Luften i terrariet skal være 26-28 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Eryx johnii kommer fra tørre lavlandsområder, og luftfugtigheden skal ligge omkring 40-50 %. Under hudskifte kan den være op til 60 %. Et hygrometer viser, om tallet holder.

LYS OG UVB
Eryx johnii er mest aktiv i skumringen og om natten, og UVB er ikke dokumenteret som nødvendigt for arten.

FODER
Eryx johnii tager hele byttedyr og er kendt for sin gode appetit. Grundfoderet er mus; store voksne hunner kan tage små rotter. Ungerne er store ved fødslen og kan starte med nyfødte rotter eller små museunger med dun.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Eryx johnii er rolig og forsøger sjældent at bide; når den er bange, slår den snarere med kroppen, uden at ramme. Bider den alligevel, må hånden ikke rives til sig, for det kan skade slangen.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Afghanistan, Pakistan, Iran, Indien og Nepal.