herpy

SLANGER

Desert Sand Boa

Eryx miliaris

Eryx miliaris er en lille, tyk sandboa fra Centralasiens ørkener og stepper, der graver sig ned med øjnene stikkende op over overfladen. De fleste bliver 40-60 cm, men den store østlige form, der tidligere blev ført som *Eryx tataricus*, kan blive over 1 m. Arten er rolig og er ofte en af de nemmeste sandboaer at få til at spise.

Familie: Boidae Tidligere navn: *Anguis miliaris; Boa tatarica; Eryx tataricus; Eryx speciosus; Eryx nogaiorum*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**40-120 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-25 år**
Aktiv	**Dag, skumring og nat**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Ørken og halvørken**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 30 × 30 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-28 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri**
Vinterhvile	**14-18 °C** 8-12 uger
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kuldstørrelse	**4-15 unger**
Kuld pr. år	**1**
Drægtighed	**120 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES bilag II og i EU's forordning 338/97 på bilag B (alle Boidae er listet samlet). Indførsel fra lande uden for EU kræver CITES-dokumenter, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) efter BEK nr. 1588 af 9.12.2024. Arten er ikke omfattet af forbudslisten for slanger i BEK nr. 1261 af 17.11.2015. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET
En voksen *Eryx miliaris* skal have et terrarie på mindst 60 × 30 × 30 cm (længde × bredde × højde). Arten bruger næsten ingen højde, så gulvarealet er det, der tæller.

TEMPERATUR
Varmen kommer nedefra. Læg en varmetape eller varmemåtte under højst en fjerdedel af gulvet i den ene ende, styret af en termostat, så bunden i den varme ende er 30-32 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Eryx miliaris lever i et tørt klima, og terrariet skal være tørt. Luftfugtigheden ligger bedst på 30-50 %; tallet er et skøn ud fra levestedet. Skift vandet i skålen jævnligt.

LYS OG UVB
UVB er ikke dokumenteret som nødvendigt for *E. miliaris*, og arten tilbringer en stor del af tiden skjult. Et svagt UVB-rør kan bruges som tilbud, hvis der samtidig er rigeligt med skjul.

FODER
Eryx miliaris tager hele byttedyr. Grundfoderet er små mus, ikke meget tykkere end slangen selv. Giv helst optøede byttedyr, ikke levende.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Eryx miliaris er rolig og bider ikke af frygt, men den kan være en grådig æder og snappe efter alt, der ligner mad, også en hånd. Håndtér den sjældent, og vask hænder efter foderet.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Rusland, Kasakhstan, Usbekistan, Turkmenistan, Afghanistan, Irak, Iran, Kina, Mongoliet, Kirgisistan, Tadsjikistan og Pakistan.