herpy

SLANGER

Red-tailed Green Ratsnake

Gonyosoma oxycephalum

Gonyosoma oxycephalum er en stor, slank træslange fra Sydøstasiens regnskove med smaragdgrøn krop, rødbrun hale og et spidst hoved. Den bliver op mod 2,4 m, er dagaktiv og lever i trækronerne. Den kræver et højt, fugtigt terrarie og en rolig holder, for temperamentet kan være uberegneligt.

Familie: Colubridae Tidligere navn: *Elaphe oxycephala; Coluber oxycephalus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**150-240 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**150 × 60 × 150 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-29 °C**
Hotspot	**29-30 °C**
Temperatur, nat	**22-25 °C**
Luftfugtighed	**70-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**36-48 mdr.**
Kuldstørrelse	**3-12 æg**
Inkubation	**90-125 dage** ved 25-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES-listerne eller i bilagene til EU's forordning 338/97, står ikke på EU's liste over invasive arter og er ikke omfattet af forbudslisten for slanger i BEK nr. 1261 af 17.11.2015. Der gælder kun dyrevelfærdslovens almindelige krav. Dyrevelfærd hører under Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV).

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et voksent dyr skal have et højt, rummeligt terrarie på mindst 150 × 60 × 150 cm (længde × bredde × højde). Arten er en aktiv klatrer, og højden er vigtigere end gulvarealet. Større er bedre, gerne 180 × 70 × 150 cm eller mere.

TEMPERATUR
Om dagen skal der være 25-29 °C. Et varmt sted i den øvre del af terrariet må nå 29-30 °C, men ikke mere. Arten tåler ikke høj varme, så pas på overophedning, især om sommeren.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal ligge på 70-80 %, og den bør svinge en smule mellem dag og nat. Forstøv terrariet 1-2 gange om dagen, så det holder luften fugtig og efterligner regntiden, og sørg for, at overfladerne tørrer igen.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv, og en jævn døgnrytme på omkring 12 timers lys og 12 timers mørke hele året er vigtig, også for avl.

FODER
Gonyosoma oxycephalum spiser hele byttedyr. I naturen er det fugle, fugleæg, firben og flagermus, og i terrarier kan arten vænnes til frosne og optøede gnavere.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Gonyosoma oxycephalum er forsvarsparat og kan være uberegnelig. Når den føler sig truet, puster den halsen op, hvæser og snapper. Bid er ikke giftige, men kan være dybe og ubehagelige.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Indonesien, Malaysia, Singapore, Indien, Myanmar (Burma), Thailand, Cambodja, Laos, Vietnam og Filippinerne.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/slanger/gonyosoma-oxycephalum