herpy

SLANGER

Western Hognose Snake

Heterodon nasicus

Heterodon nasicus er en lille, kompakt snog fra de nordamerikanske prærier med en opadvendt snude, som den graver med i løs jord. Truet puster den sig op, hvæser og spiller til sidst død. Den er dagaktiv, rolig og nem at passe og derfor et godt førstevalg blandt slanger. Den er bagtandet med en svag gift; bid er sjældne, men kan give en tydelig hævelse.

Familie: Colubridae Tidligere navn: *Heterodon gloydi* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**35-90 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**80-400 g**
Levetid	**15-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Halvørken og savanne**
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**90 × 45 × 40 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**23-27 °C**
Hotspot	**31-35 °C**
Temperatur, nat	**16-22 °C**
Luftfugtighed	**30-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Vinterhvile	**5-15 °C** 4-12 uger
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**24-36 mdr.**
Kuldstørrelse	**2-23 æg**
Kuld pr. år	**1-2**
Inkubation	**51-64 dage** ved 26-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES-listerne eller i bilagene til EU's forordning 338/97, står ikke på EU's liste over invasive arter og er ikke omfattet af forbudslisten for slanger i BEK nr. 1261 af 17.11.2015, som ikke nævner slægten Heterodon. Der gælder kun dyrevelfærdslovens almindelige krav. Dyrevelfærd hører under Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV).

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 90 × 45 × 40 cm (længde × bredde × højde).
TEMPERATUR	Hold en tydelig gradient. Den varme ende skal have en solplads på 31-35 °C, målt på overfladen, mens lufttemperaturen ellers er 23-27 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal ligge omkring 30-60 %. Arten kommer fra tørre egne og har ikke brug for fugtig luft, men for tør luft og støvende bund giver snavs i næsen og hudskift, der hænger fast.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og har gavn af et klart dagslys. Lyset kan være tændt 12 timer i døgnet året rundt eller følge årstiderne med 14-16 timer om foråret og sommeren og 8-10 timer om efteråret og vinteren.
FODER	I naturen æder *H. nasicus* især tudser og andre padder, men også øgler, gnavere, krybdyræg, fugleæg og af og til andre slanger. I fangenskab er hovedfoderet frosne, optøede mus.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Heterodon nasicus* er rolig og nem at håndtere. Truslerne er bluf, og slangen bider næsten aldrig i forsvar. Lad den falde til ro efter et udfald, og forstyr den ikke, mens den spiller død.
OPRINDELIG UDBREDELSE	USA og Canada.