herpy

SLANGER

Eastern Hognose Snake

Heterodon platirhinos

Heterodon platirhinos er en kraftig snog fra det østlige Nordamerika med opadvendt snude, som den graver med i sandet. Truet breder den halsen ud, hvæser og spiller til sidst død. I naturen lever den næsten kun af tudser, og derfor er den sværere at holde end de fleste andre slanger: mange dyr tager ikke mus uden videre.

Familie: Colubridae Tidligere navn: *Heterodon platyrhinos; Heterodon browni*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**50-115 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**90 × 45 × 40 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Hotspot	**30-31 °C**
Temperatur, nat	**16-22 °C**
Luftfugtighed	**50-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Vinterhvile	**12-15 °C** 8 uger
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**18-24 mdr.**
Kuldstørrelse	**10-30 æg**
Kuld pr. år	**1**
Inkubation	**45-90 dage** ved 28-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES-listerne eller i bilagene til EU's forordning 338/97, står ikke på EU's liste over invasive arter og er ikke omfattet af forbudslisten for slanger i BEK nr. 1261 af 17.11.2015, som ikke nævner slægten Heterodon. Der gælder kun dyrevelfærdslovens almindelige krav. Dyrevelfærd hører under Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV).

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 90 × 45 × 40 cm (længde × bredde × højde). Gulvarealet er vigtigere end højden, for arten er aktiv og graver.

TEMPERATUR
Hold en tydelig gradient. Solpladsen skal være 30-31 °C, og resten af terrariet 24-29 °C om dagen. Om natten slukkes varmen, og temperaturen må gerne falde til 16-22 °C, men aldrig under 16 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal ligge på 50-60 %. Det er en anelse mere end for den nære slægtning *Heterodon nasicus*, og et hygrometer viser, om tallet holder.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og har gavn af klart dagslys. Lyset kan være tændt 12 timer i døgnet året rundt eller følge årstiderne med 14 timer om foråret, 16 om sommeren, 10 om efteråret og 8 om vinteren. UVB anbefales.

FODER
I naturen æder *H. platirhinos* mest padder, især tudser, men også firben og andre smådyr. I fangenskab er fodringen den sværeste del af pasningen: mange dyr, især unger, afviser mus i begyndelsen.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Heterodon platirhinos er rolig, men mere sky og defensiv end *H. nasicus*. Hold håndteringen på en gang om ugen. Lad nye dyr falde til i to uger, og start først, når de æder regelmæssigt.

OPRINDELIG UDBREDELSE
USA og Canada.