herpy

SLANGER

Gray-banded Kingsnake

Lampropeltis alterna

Lampropeltis alterna er en slank kongeslange fra Chihuahua-ørkenen i det sydvestlige USA og det nordlige Mexico, kendt for sin sølvgrå grundfarve med orange, røde og sorte tværbånd. Den bliver 70-120 cm, er rolig og passes i et tørt terrarie med klippeagtige skjul. Den æder hovedsagelig øgler i naturen, men tager i fangenskab som regel mus, og den kan blive over 25 år.

Familie: Colubridae Tidligere navn: *Ophibolus alternus; Lampropeltis blairi; Lampropeltis mexicana alterna*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**70-120 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-30 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Ørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**20-28 °C**
Hotspot	**29-32 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Vinterhvile	**13-16 °C** 8-12 uger
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**3-13 æg**
Inkubation	**55-70 dage** ved 26-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke på CITES-listerne, ikke i EU-bilag A-D og ikke på EU's liste over invasive arter (den står ikke blandt de arter, der hører under *Lampropeltis getula* i bred forstand). Opslagstabellerne nævner ingen særlige danske forbud. Dyrevelfærdsloven gælder som for alle krybdyr.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 90 × 45 × 45 cm (længde × bredde × højde).
TEMPERATUR	Terrariet skal have en tydelig temperaturgradient, så dyret selv kan vælge sted. Under varmekilden skal overfladen være 29-32 °C, og i den kolde ende 20-24 °C. Luften i terrariet er 20-28 °C om dagen.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Arten kommer fra et tørt område og skal have en lav til moderat luftfugtighed på 30-50 %. Højere værdier i længere tid giver hudproblemer og luftvejsinfektioner. Terrariet skal ventileres godt, og bunden skal være tør.
LYS OG UVB	Arten er natlig og skjult og får i naturen kun lidt sollys. UVB er ikke nødvendig, men anbefales af hensyn til velfærden.
FODER	I naturen er øgler hovedføden, men i fangenskab æder dyrene som regel optøede, frosne mus, som er den sikreste kost. Tilbyd ikke levende gnavere, for de kan bide og skade slangen.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*L. alterna* er rolig og tolerant og passer godt som første slange. Giv et nyt dyr omkring to uger i fred, og start håndtering, når det æder regelmæssigt.
OPRINDELIG UDBREDELSE	USA og Mexico.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/slanger/lampropeltis-alterna