herpy

SLANGER

Speckled Kingsnake

Lampropeltis holbrooki

Lampropeltis holbrooki er en middelstor til stor kongeslange fra det centrale og sydlige USA, sort med en lille gulhvid plet på næsten hver skæl, så mønsteret ligner salt og peber. Den bliver 90-120 cm, æder gnavere, øgler, frøer og andre slanger og er robust og nem at passe. Den passes enkeltvis i et gulvterrarie med varmeplads og moderat luftfugtighed og kan blive over 20 år.

Familie: Colubridae Tidligere navn: *Lampropeltis getula holbrooki; Coronella sayi* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**90-120 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-25 år**
Aktiv	**Dag og skumring**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Vådområde og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**21-28 °C**
Hotspot	**29-32 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**5-15 æg**
Inkubation	**60-70 dage** ved 26-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Invasiv art: *Lampropeltis holbrooki* står som del af *Lampropeltis getula* i bred forstand på EU's liste over invasive arter af unionsbetydning (gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141, udvidet med (EU) 2022/1203). Efter art. 7 i forordning (EU) nr. 1143/2014 er det forbudt at indføre, holde, avle, transportere, sælge, bruge, bytte, lade formere sig og udsætte arten. Art. 31: kæledyr, der blev holdt før optagelsen i 2022, må beholdes til de dør, i lukket opbevaring, hvor formering og flugt er udelukket. Spørg SGAV om de danske regler. Ikke CITES eller EU-bilag A-D.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes lidt artsspecifik viden om pasningen af *Lampropeltis holbrooki*. Tallene her er lånt fra kongeslanger i almindelighed, især *Lampropeltis californiae* og *Lampropeltis getula*, som har samme krav.
TEMPERATUR	Dyret regulerer sin temperatur ved at flytte mellem varme og kolde steder, så terrariet skal have en tydelig gradient. Overfladen under varmelampen skal være 29-32 °C, målt med et infrarødt termometer, og den kolde ende 21-26 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal ligge på 40-60 %, målt med et digitalt hygrometer midt i terrariet. Den er højere i den kolde ende og om natten og lavere i den varme ende, og det er normalt.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og soler sig i naturen. Den kan klare sig uden UVB, men UVB anbefales for den bedste velfærd. Det passer til Ferguson-zone 2.
FODER	*L. holbrooki* er kødæder og skal have hele byttedyr. Mus er standardfoder, og når dyret vokser, bruges unge rotter.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*L. holbrooki* er robust og tolerant. Giv et nyt dyr omkring 2 uger i fred, og start først håndtering, når det æder regelmæssigt. Begynd med korte omgange på højst 5 minutter, og løft dyret nedefra, med støtte under kroppen.
OPRINDELIG UDBREDELSE	USA.