herpy

SLANGER

Arizona Mountain Kingsnake

Lampropeltis pyromelana

Lampropeltis pyromelana er en slank kongeslange fra bjergene i det sydvestlige USA, kendt for sine røde, sorte og hvide bånd og den hvide snude. Den bliver 50-100 cm, er hurtig og dagaktiv og passes tørt og køligt med en vinterhvile. Arten æder i naturen hovedsagelig øgler og kan blive 15-20 år.

Familie: Colubridae Tidligere navn: *Ophibolus pyromelanus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**50-100 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-20 år**
Aktiv	**Dag og skumring**
Levevis	**Klippeboende og jordboende**
Biotop	**Bjergskov og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-28 °C**
Hotspot	**28-30 °C**
Temperatur, nat	**15-20 °C**
Luftfugtighed	**40-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri**
Vinterhvile	**10-13 °C** 8-12 uger
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**3-9 æg**
Inkubation	**55-70 dage** ved 26-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke på CITES-listerne, ikke i EU's bilag A-D og ikke på EU's liste over invasive arter (den hører ikke til de arter, der er samlet under *Lampropeltis getula* i bred forstand). Den er ikke omfattet af forbudslisten for slanger i BEK nr. 1261 af 17.11.2015. Dyrevelfærdslovens almindelige krav gælder; dyrevelfærd hører under Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV).

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et voksent dyr skal have mindst 90 × 45 × 45 cm (længde × bredde × højde). Arten er aktiv, klatrer på sten og grene og udnytter hele højden, så et højere terrarie er en fordel.
TEMPERATUR	Arten kommer fra køligere bjergegne og tåler ikke de høje temperaturer, der bruges til mange andre kongeslanger.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Arten kommer fra et tørt område og klarer sig med en luftfugtighed på 40-50 %, og kortvarige toppe op til 60 % er uden betydning. Længerevarende høj fugtighed giver hudproblemer og luftvejsinfektioner.
LYS OG UVB	Arten er mest aktiv om formiddagen og sidst på eftermiddagen, men holder sig tæt ved sine skjul. UVB er ikke nødvendigt, men svagt UVB-lys over en del af terrariet er gavnligt og giver en naturlig dagrytme.
FODER	I naturen er øgler hovedføden, og slangen tager også slanger, små gnavere, flagermus og fugle. I fangenskab æder de fleste dyr optøede, frosne mus, som er den sikreste kost.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Lampropeltis pyromelana* er hurtig og livlig og passer bedst til en holder, der har erfaring med andre slanger. Unger kan være nervøse og afgive sekret eller nippe, men mange bliver rolige ved regelmæssig, kort håndtering.
OPRINDELIG UDBREDELSE	USA.