herpy

SLANGER

Desert Kingsnake

Lampropeltis splendida

Lampropeltis splendida er en middelstor til stor kongeslange fra ørkenegnene i det sydvestlige USA og det nordlige Mexico, sort eller mørkebrun med gule tværbånd, der er brudt op i små pletter. Den bliver 90-115 cm, æder gnavere, øgler og andre slanger og er robust og nem at passe. Den passes enkeltvis i et gulvterrarie med varmeplads og moderat luftfugtighed og kan blive over 20 år.

Familie: Colubridae Tidligere navn: *Lampropeltis getula splendida; Ophibolus splendidus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**90-115 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-25 år**
Aktiv	**Dag og skumring**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Ørken og halvørken**
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Hotspot	**29-32 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**5-12 æg**
Inkubation	**60-70 dage** ved 26-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Invasiv art: *Lampropeltis splendida* står som del af *Lampropeltis getula* i bred forstand på EU's liste over invasive arter af unionsbetydning (gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141, udvidet med (EU) 2022/1203). Efter art. 7 i forordning (EU) nr. 1143/2014 er det forbudt at indføre, holde, avle, transportere, sælge, bruge, bytte, lade formere sig og udsætte arten. Art. 31: kæledyr, der blev holdt før optagelsen i 2022, må beholdes til de dør, i lukket opbevaring, hvor formering og flugt er udelukket. Spørg SGAV om de danske regler. Ikke CITES eller EU-bilag A-D.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt artsspecifik viden om pasningen af *Lampropeltis splendida*. Tallene her er lånt fra kongeslanger i almindelighed, især *Lampropeltis californiae* og *Lampropeltis getula*, som har samme krav.
TEMPERATUR	Dyret regulerer sin temperatur ved at flytte mellem varme og kolde steder, så terrariet skal have en tydelig gradient. Overfladen under varmelampen skal være 29-32 °C, målt med et infrarødt termometer, og den kolde ende 21-26 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal ligge på 40-60 %, målt med et digitalt hygrometer midt i terrariet. Den er højere i den kolde ende og om natten og lavere i den varme ende, og det er normalt. Vedvarende klam luft giver luftvejsinfektion.
LYS OG UVB	Arten er aktiv om dagen og soler sig i naturen. Den kan klare sig uden UVB, men UVB anbefales for den bedste velfærd. Det passer til Ferguson-zone 2.
FODER	*L. splendida* er kødæder og skal have hele byttedyr. Mus er standardfoder, og når dyret vokser, bruges unge rotter.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*L. splendida* er robust og tolerant. Giv et nyt dyr omkring 2 uger i fred, og start først håndtering, når det æder regelmæssigt. Begynd med korte omgange på højst 5 minutter, og løft dyret nedefra, med støtte under kroppen.
OPRINDELIG UDBREDELSE	USA og Mexico.