herpy

SLANGER

Eastern milksnake

Lampropeltis triangulum

Lampropeltis triangulum er en slank, hemmelighedsfuld snog fra det østlige Nordamerika. Navnet dækkede længe en hel gruppe farvestrålende slanger, og mange af dem, der sælges under det, hører i dag til andre arter. Slangen er nataktiv, rolig og let at holde, men lever af gnavere og må ikke bo sammen med andre slanger.

Familie: Colubridae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**55-115 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-20 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 45 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**23-27 °C**
Hotspot	**29-32 °C**
Temperatur, nat	**21-23 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri**
Vinterhvile	**11-13 °C** 10-12 uger
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**36-48 mdr.**
Kuldstørrelse	**2-24 æg**
Kuld pr. år	**1**
Inkubation	**58-65 dage** ved 27-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES-listerne eller i bilagene til EU's forordning 338/97, står ikke på EU's liste over invasive arter og er ikke omfattet af forbudslisten for slanger i BEK nr. 1261 af 17.11.2015. Der gælder kun dyrevelfærdslovens almindelige krav. Dyrevelfærd hører under Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV).

Pasning i korte træk

TERRARIET	En voksen *Lampropeltis triangulum* skal have et terrarie på mindst 120 × 60 × 45 cm. Små dyr under 90 cm klarer sig med 90 × 45 × 45 cm. Unger kan starte i en lille boks og flyttes op i takt med væksten.
TEMPERATUR	*Lampropeltis triangulum* er nataktiv og varmer sig mest under sten og andre genstande, som solen har varmet op, men soler sig af og til åbent.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	En relativ luftfugtighed på 40-60 % er passende. Den må gerne være højere i den kølige ende og om natten og lavere i den varme ende. Mål i midten af terrariet med et digitalt hygrometer.
LYS OG UVB	Arten er nataktiv og behøver ikke stærkt lys. UVB er ikke nødvendigt, men kan være gavnligt.
FODER	Voksne *Lampropeltis triangulum* fodres med mus og unge rotter, og store individer tager små til mellemstore rotter. Byttet skal være frossent og optøet og ikke over 1,5 gange så bredt som slangens bredeste sted.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Lampropeltis triangulum* er som regel rolig og tåler håndtering godt, men enkelte dyr er nervøse og bider. Efter hjemkomsten får dyret en uge eller to til at falde til, og håndtering begynder først, når det spiser regelmæssigt.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Canada og USA.