herpy

SLANGER

Giant Madagascar Hognose Snake

Leioheterodon madagascariensis

Leioheterodon madagascariensis er en stor, kraftig og dagaktiv snog fra Madagaskar, der kan blive op mod 180 cm lang. Snuden er spids og bruges til at grave med, og truet breder den nakken ud og hvæser. Den æder frøer, øgler, æg og gnavere. Slangen er bagtandet med en mild gift; bid er sjældne, men kan give flere dages hævelse og smerte.

Familie: Pseudoxyrhophiidae Tidligere navn: *Heterodon madagascariensis; Lioheterodon madagascariensis*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**90-150 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-25 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Savanne og tørskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**150 × 60 × 50 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Hotspot	**29-32 °C**
Temperatur, nat	**22-24 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**7-12 æg**
Inkubation	**60 dage** ved 27-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Bilag D**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på bilag D i EU's forordning om handel med vilde dyr og er ikke opført på CITES-listerne. Der kræves ingen tilladelser ved køb og salg inden for EU, men dyr, der indføres fra lande uden for EU, skal anmeldes ved grænsen. Arten står ikke på EU's liste over invasive arter og ikke på forbudslisten for slanger i BEK nr. 1261 af 17.11.2015, som ikke forbyder bagtandede slanger med svag gift. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav. Dyrevelfærd hører under Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV).

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt udgivet viden om pasningen af *Leioheterodon madagascariensis*, og arten er ikke almindelig i fangenskab.
TEMPERATUR	Terrariet skal have en tydelig gradient. Den kølige side holdes på 24-27 °C, og den varme side, målt ved overfladen under varmekilden, på 29-32 °C. Om natten sænkes temperaturen lidt, til omkring 22-24 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal ligge på 60-80 %, med et fugtigt skjul (en kasse med fugtigt kokosmuld eller sphagnum), som hjælper ved hudskifte. Bunden må tørre lidt mere ud i en periode svarende til den tørre tid, men aldrig helt.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv. Lyset kan køre med 12 timer lys og 12 timer mørke. UVB er ikke nødvendigt, men kan være en fordel for sundhed og trivsel. Ferguson-zonen er ikke dokumenteret.
FODER	I naturen æder *Leioheterodon madagascariensis* frøer og tudser, øgler, fisk, æg, fugleunger og gnavere. Arten er let at fodre og tager i fangenskab optøede rotter og mus.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Leioheterodon madagascariensis* er aktiv og energisk og kan som regel tæmmes og håndteres. Unge dyr er mere nervøse og defensive og kan hvæse, brede nakken ud, lave skinangreb eller spille død.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Madagaskar.