herpy

SLANGER

Rosy Boa

Lichanura trivirgata

Lichanura trivirgata er en lille, rolig boa fra ørkener og klippeterræn i det sydvestlige USA og det nordvestlige Mexico. Den bliver 60-90 cm, har tre striber langs kroppen, bor i et lille, tørt terrarie og kan blive mere end 20 år gammel. Det gør den til en af de nemmeste slanger for en begynder.

Familie: Boidae Tidligere navn: *Lichanura roseofusca; Lichanura myriolepis*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**60-90 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**20-30 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Klippeboende og jordboende**
Biotop	**Ørken, halvørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**70 × 40 × 30 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**20-40 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Ikke nødvendig**
Vinterhvile	**13-16 °C** 12 uger
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kønsmoden	**24-36 mdr.**
Kuldstørrelse	**3-6 unger**
Kuld pr. år	**1**
Drægtighed	**150-180 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES bilag II og i EU's forordning 338/97 på bilag B (alle Boidae er listet samlet). Indførsel fra lande uden for EU kræver CITES-dokumenter, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) efter BEK nr. 1588 af 9.12.2024. Arten er ikke omfattet af forbudslisten for slanger i BEK nr. 1261 af 17.11.2015. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET	En voksen *Lichanura trivirgata* skal have et terrarie på mindst 70 × 40 × 30 cm (længde × bredde × højde). Arten bruger ikke højden, men har brug for gulvareal til en varm og en kølig ende.
TEMPERATUR	*Lichanura trivirgata* skal have en tydelig temperaturgradient. Om dagen er lufttemperaturen 22-26 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	*Lichanura trivirgata* kommer fra et tørt klima, og terrariet skal være tørt, med en luftfugtighed omkring 20-40 %. Tallet er et skøn ud fra levestedet. Bunden må ikke blive våd.
LYS OG UVB	*Lichanura trivirgata* lever skjult og er mest aktiv om natten, så UVB er ikke nødvendigt. Lys er kun til for at se slangen. Tænd og sluk det med et ur, så dag og nat holdes adskilt.
FODER	*Lichanura trivirgata* æder gnavere. Voksne dyr får en stor mus eller en lille rotte hver 10.-14. dag fra forår til efterår. Giv helst frosne og optøede byttedyr frem for levende, og tilbyd dem med en lang pincet.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Lichanura trivirgata* er meget rolig og tåler håndtering godt. Rør let ved den med en lang pincet, før du tager den op, så den ved, at det ikke er fodring.
OPRINDELIG UDBREDELSE	USA og Mexico.