herpy

SLANGER

Carpet Python

Morelia spilota

Morelia spilota er en kraftig, semi-trælevende pyton med en meget vid udbredelse i Australien og på det sydlige New Guinea. Mønstret varierer fra bånd og pletter til sort og gul tegning, og størrelsen fra omkring 120 til 300 cm afhængigt af underart. Den bliver rolig med alderen og trives i et stort, højt terrarie, men den bliver stor og lever i 20-30 år.

Familie: Pythonidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**120-300 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**20-30 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Savanne, tørskov og regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**150 × 75 × 90 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Hotspot	**32-38 °C**
Temperatur, nat	**22-25 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**10-50 æg**
Kuld pr. år	**1**
Inkubation	**50-55 dage** ved 31-32 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i bilag B i EU's forordning 338/97 (Pythonidae spp.). Dyret skal kunne dokumenteres lovligt erhvervet, og indførsel fra lande uden for EU kræver CITES-tilladelse, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) efter BEK nr. 1588 af 9.12.2024. Arten står ikke på forbudslisten i BEK nr. 1261 af 17.11.2015; ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET

En voksen *Morelia spilota* skal have et terrarie på mindst 150 × 75 × 90 cm. Det passer til de mindre underarter på 1,5-2 m. Til de større, op til 3 m, skal terrariet være mindst 200 × 100 × 90 cm.

TEMPERATUR

Terrariet skal have en tydelig gradient. Overfladen under varmelampen skal være 35-38 °C, den kølige ende 24-26 °C og natten 22-25 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Arten er ikke kræsen med luftfugtigheden og klarer sig i et bredt interval. Hold den på 40-60 % med en stor vandskål med frisk vand. Et skjul med fugtigt sphagnum hjælper under hudskifte.

LYS OG UVB

Arten er hovedsagelig natlig, men kan være aktiv om dagen. UVB er ikke nødvendigt for at holde den i live, men det anbefales, fordi det understøtter D3-optagelsen og døgnrytmen.

FODER

Morelia spilota æder hele byttedyr. Brug frosne og optøede mus og rotter, ikke levende, og varm dem til omkring 38 °C. Hamstere, gerbiler, vagtler og kyllinger kan bruges til variation.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Morelia spilota er nysgerrig og aktiv og vænner sig i reglen godt til håndtering. Unger under 1-2 år er ofte nervøse og bider; de falder til ro med alderen.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Australien, Indonesien og Papua Ny Guinea.