herpy

SLANGER

Grøn træpyton

Morelia viridis

Morelia viridis er en lysegrøn, trælevende pyton fra regnskovene på det sydlige New Guinea og Cape York, der hviler i tætte løkker over en gren og slår ned på byttet fra et fast udkigspunkt. Ungerne er gule og skifter til grønt i løbet af det første leveår. Arten er smuk og holdbar, men stiller krav til fugt, ro og håndtering.

Familie: Pythonidae Engelsk: Green Tree Python Tidligere navn: *Chondropython viridis; Python viridis* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**100-160 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-20 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**90 × 60 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Hotspot	**27-31 °C**
Temperatur, nat	**20-22 °C**
Luftfugtighed	**40-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**29-43 mdr.**
Kuldstørrelse	**6-32 æg**
Kuld pr. år	**1**
Inkubation	**39-65 dage** ved 29-31 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i bilag B i EU's forordning 338/97 (Pythonidae spp.). Dyret skal kunne dokumenteres lovligt erhvervet, og indførsel fra lande uden for EU kræver CITES-tilladelse, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) efter BEK nr. 1588 af 9.12.2024. Arten står ikke på forbudslisten i BEK nr. 1261 af 17.11.2015; ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 90 × 60 × 60 cm (længde × bredde × højde). Større er bedre, og 120 × 60 × 60 cm er et godt mål til en voksen hun.

TEMPERATUR
Der skal være en tydelig gradient. Solpladsen på den øverste gren skal være 27-31 °C og den køligere del af terrariet 24-26 °C. Om natten slukkes varmen, og temperaturen må falde til 20-22 °C, men ikke under 20 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal ligge på 40-70 % og svinge: højere lige efter sprøjtning og derefter faldende til omkring 40 %, før der sprøjtes igen.

LYS OG UVB
Unge dyr er dagaktive, og voksne dyr er mest aktive i skumringen og om natten, men begge har gavn af et klart dagslys. Lyset skal tændes 12 timer i døgnet og slukkes helt om natten.

FODER
M. viridis æder hele byttedyr. Voksne dyr får mus, små rotter, hamstere, gerbiler og vagtler, gerne i variation, og unger får små mus. Bytte skal være optøet fra frost og varmet til cirka 38 °C.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Morelia viridis er sky og stedfast. Den bliver sjældent lige så tam som mange snoge og skal ikke håndteres hver dag. Den har ry for at bide, men det er oftest en følge af hård behandling.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Indonesien, Papua Ny Guinea og Australien.