herpy

SLANGER

Kornsnog

Pantherophis guttatus

En slank, rolig og hårdfør snog fra det sydøstlige USA med røde, sortkantede pletter på orange bund. Den bliver 90-150 cm, tåler håndtering og tilgiver de fleste begynderfejl, og derfor er den et af de mest oplagte valg til den, der vil have sin første slange.

Familie: Colubridae Engelsk: Corn snake Tidligere navn: *Elaphe guttata* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**90-150 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-25 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Klippeterræn og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**50-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**16-24 mdr.**
Kuldstørrelse	**10-30 æg**
Kuld pr. år	**1-2**
Inkubation	**55-65 dage** ved 27-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES-listerne eller i bilagene til EU's forordning 338/97, står ikke på EU's liste over invasive arter og er ikke omfattet af forbudslisten for slanger i BEK nr. 1261 af 17.11.2015. Der gælder kun dyrevelfærdslovens almindelige krav. Dyrevelfærd hører under Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV).

Pasning i korte træk

TERRARIET

En voksen *Pantherophis guttatus* skal have et terrarie på mindst 120 × 60 × 60 cm (længde × bredde × højde). Tommelfingerreglen er, at længden mindst svarer til slangens egen længde, og bredden til halvdelen af den.

TEMPERATUR

Der skal være en tydelig temperaturgradient, så slangen selv kan vælge. Solpladsen under varmekilden skal være 30-32 °C, og den kølige ende 24-27 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden skal ligge på omkring 50-70 %. Angivelserne svinger fra 40-60 % til 65-75 %, og arten klarer sig fint i hele spændet, så længe der er et fugtigt skjul til hudskiftet.

LYS OG UVB

Pantherophis guttatus er mest aktiv i skumringen, men skal have en tydelig dag og nat. Lyset er tændt 12 timer i døgnet, gerne 13 timer om sommeren og 11 timer om vinteren, styret af et tænd-sluk-ur.

FODER

Pantherophis guttatus spiser hele, frosne og optøede gnavere. Mus er det mest brugte foder, og større dyr får små rotter. Vagtelkyllinger, vagtelæg og små firben giver variation og en mere alsidig kost, men er ikke nødvendige.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Pantherophis guttatus tåler regelmæssig håndtering bedre end de fleste krybdyr og bliver som regel rolig og nysgerrig. Lad et nyt dyr falde til i to uger og spise regelmæssigt, før det håndteres.

OPRINDELIG UDBREDELSE

USA.