herpy

SLANGER

Kornsnog

Pantherophis guttatus

En slank, rolig og hårdfør snog fra det sydøstlige USA med røde, sortkantede pletter på orange bund. Den bliver 90-150 cm, tåler håndtering og tilgiver de fleste begynderfejl, og derfor er den et af de mest oplagte valg til den, der vil have sin første slange.

Familie: Colubridae Engelsk: Corn snake Tidligere navn: *Elaphe guttata* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**90-150 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-25 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Klippeterræn og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**50-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**16-24 mdr.**
Kuldstørrelse	**10-30 æg**
Kuld pr. år	**1-2**
Inkubation	**55-65 dage** ved 27-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES-listerne eller i bilagene til EU's forordning 338/97, står ikke på EU's liste over invasive arter og er ikke omfattet af forbudslisten for slanger i BEK nr. 1261 af 17.11.2015. Der gælder kun dyrevelfærdslovens almindelige krav. Dyrevelfærd hører under Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV).

Om arten

Pantherophis guttatus er en slank, ikke-giftig snog med ovalt hoved og runde pupiller. Den vilde form er orange eller brungul med store, sortkantede røde eller brune pletter ned ad ryggen og to rækker mindre pletter langs hver side. Bugen har ofte et sort-hvidt skakternet mønster. Pletterne forklarer det videnskabelige artsnavn: *guttatus* er latin for plettet. Slægtsnavnet kommer fra græsk og betyder panterslange, formentlig med henvisning til det plettede og farverige mønster.

Nyklækkede unger måler 20-35 cm og er blegere og mere ensfarvede end de voksne. De voksne bliver typisk 90-150 cm inklusive hale; de mindste voksne er omkring 60 cm, og enkelte når 180 cm. Hannerne kan blive lidt større end hunnerne, men forskellen er lille. Farver og tegninger varierer med lokaliteten, og i fangenskab er der avlet et stort antal morfer med helt andre farver og mønstre, fx albino, snehvide og næsten sorte dyr. Pasningen er den samme for alle morfer.

Tidligere hed arten *Elaphe guttata*, og det navn findes stadig i ældre litteratur. Arten er nysgerrig og klatrer gerne, men tilbringer også meget tid under jorden og i skjul. Den har et roligt temperament og tåler regelmæssig håndtering, og det er en af grundene til, at den er så udbredt i terrarier.

Udbredelse og levested

Pantherophis guttatus er hjemmehørende i det sydøstlige USA. Udbredelsen går fra det sydlige New Jersey, Delaware og Maryland mod syd gennem Virginia, North og South Carolina og Georgia til hele Florida og vestpå gennem Kentucky, Tennessee, Alabama og Mississippi til Louisiana. Bestandene længere mod vest, fra det sydvestlige Illinois gennem Great Plains til Texas, regnes i dag til den nærtbeslægtede *Pantherophis emoryi*, der tidligere var en underart.

Arten er også fundet på enkelte caribiske øer, bl.a. Caymanøerne, De Amerikanske Jomfruøer, Anguilla, Antigua og Saint-Barthélemy, og der er en indført bestand i Bahia i Brasilien. Kortet viser udbredelsen i USA.

> **Oprindelig udbredelse:** USA.

LEVESTED

Pantherophis guttatus lever i mange slags levesteder på land: løvskov og blandskov, klippefyldte skråninger, enge, åbne græsarealer, skovbryn og dyrket land. Den ses også i og ved huse, lader og forladte bygninger, hvor der er gode skjul og rigeligt med gnavere. Den findes fra havniveau op til omkring 1.800 m, men holder sig oftest på lavere højder.

Slangen er mest aktiv i skumringen og om natten. Den klatrer i træer og buske efter fugle og æg og følger gnavere ned i deres gange. Når den ikke jager, hviler den under bark, i stubbe, i sprækker og i huller i jorden. Den soler sig også på sten. Om vinteren er den mindre aktiv, især i den nordlige del af udbredelsen, mens den i syd kan yngle næsten hele året.

Pasning

TERRARIET

En voksen *Pantherophis guttatus* skal have et terrarie på mindst 120 × 60 × 60 cm (længde × bredde × højde). Tommelfingerreglen er, at længden mindst svarer til slangens egen længde, og bredden til halvdelen af den. Højden på 60 cm giver plads til grene, som arten klatrer på. Større er altid bedre. Arten skal holdes enkeltvis.

Unger er små og gode til at skjule sig, men kan som regel flytte direkte ind i et godt sikret terrarie i voksenstørrelse, når der er mange tætte skjul. De første måneder kan et mindre terrarie med hængslede døre foran gøre det lettere at holde øje med dyret.

Indret med mindst to skjul, et i den varme og et i den kølige ende, plus et fugtigt skjul til hudskifte. Tilføj grene, korkbark og kunstige eller levende planter, så slangen kan klatre og strække sig. Som bund bruges et tykt lag fugtholdende materiale, fx en blanding af økologisk muldjord, kokosfibre og lidt legesand, så den kan grave. Fjern afføring straks, og skift bunden helt hver 3.-4. måned. Undgå spåner af fyr og ceder, fordi de aromatiske olier kan skade slangen.

Terrariet skal have et låg, der kan låses. Arten er en dygtig flugtkunstner, og en ung slange kan snige sig ud gennem meget små åbninger. Terrarier med frontdøre og netlåg er sikrest.

TEMPERATUR

Der skal være en tydelig temperaturgradient, så slangen selv kan vælge. Solpladsen under varmekilden skal være 30-32 °C, og den kølige ende 24-27 °C. Om natten må temperaturen falde til almindelig stuetemperatur, 20-24 °C, og varmen slukkes. Nyklækkede og unge dyr under et år holdes varme også om natten.

Brug en halogenspot eller en anden glødepære over netlåget, der opvarmer en solplads, hvor slangen kan lægge sig. Under et skjul ved solpladsen kan der suppleres med en varmemåtte, men den skal altid styres af en termostat og ligge under bunden eller under skjulet, så slangen ikke kommer i direkte kontakt med den. Mål temperaturen med digitale termometre med føler: én på solpladsen og én i den kølige ende. Hold altid varmekilden uden for slangens rækkevidde, så den ikke kan blive brændt.

Læs mere: Varme og temperatur

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden skal ligge på omkring 50-70 %. Angivelserne svinger fra 40-60 % til 65-75 %, og arten klarer sig fint i hele spændet, så længe der er et fugtigt skjul til hudskiftet. En tyk, fugtholdende bund med et lag løv og en stor vandskål hjælper, men i den høje ende af spændet skal der også sprøjtes. Fugten er højest om natten og i den kølige ende. Konstant våd bund og stillestående luft giver mug, så ventilationen skal være god.

En stor, tung vandskål med frisk vand skal altid stå fremme. Skift vandet dagligt, og skur skålen, hvis den er snavset. Slangen drikker af skålen og kan også lægge sig i den. Vælg en skål, der ikke vælter.

Læs mere: Luftfugtighed, sprøjtning og ventilation

LYS OG UVB

Pantherophis guttatus er mest aktiv i skumringen, men skal have en tydelig dag og nat. Lyset er tændt 12 timer i døgnet, gerne 13 timer om sommeren og 11 timer om vinteren, styret af et tænd-sluk-ur. Natlys, også farvet, er unødvendigt og kan forstyrre døgnrytmen.

Arten kan leve uden UVB, men UVB anbefales, fordi det gavner både trivsel og sundhed. Den hører til Ferguson-zone 1-2. Brug et T5 HO-rør på 5-6 % over den varme ende, og sigt efter et UV-indeks på højst 2-3 på solpladsen. Med rør over et net er afstanden fra rør til slangens ryg på solpladsen ca. 25-35 cm, uden net ca. 35-45 cm; mål helst med et UV-meter. Sørg for skygge og skjul i resten af terrariet. Skift røret hver 12. måned, fordi UV-udbyttet falder, selv om røret stadig lyser. Glas og plast foran røret stopper UVB.

Læs mere: Lys og UVB

FODER

Pantherophis guttatus spiser hele, frosne og optøede gnavere. Mus er det mest brugte foder, og større dyr får små rotter. Vagtelkyllinger, vagtelæg og små firben giver variation og en mere alsidig kost, men er ikke nødvendige. Levende bytte frarådes, fordi gnaveren kan skade slangen. Vil slangen kun tage levende bytte, skal fodringen overvåges, og byttet skal ud af terrariet igen efter højst en time. Bedøv aldrig levende bytte.

Byttets bredde skal svare til 1-1,5 gange slangens bredeste del. Flere bytter samlet må højst veje omkring 10 % af slangens vægt. Retningsgivende fodringsintervaller:

- Nyklækkede unger (20-50 cm): hver 5.-7. dag.
- Ungdyr (50-115 cm): hver 7.-10. dag.
- Halvvoksne dyr (90-125 cm): hver 10.-12. dag.
- Voksne dyr over 90 cm: hver 14.-21. dag.
- Ældre dyr over 18 år: hver 10.-14. dag.
- Over- eller undervægtige dyr: et andet interval, men først efter en dyrlæges vurdering.

Tø byttet langsomt i køleskab natten før, og varm det til omkring 38 °C i en lukket pose i varmt vand lige før fodring. Vej slangen månedligt, og tilpas interval og størrelse, så vægten holder sig jævn. Foderdyr fra opdræt kan mangle D-vitamin, så pudr byttet let med et kombineret kalk- og vitamintilskud en gang imellem, især uden UVB. Brug aldrig vildfangede gnavere, som kan overføre sygdomme og parasitter.

Læs mere: Foderdyr: hold og avl Læs mere: Kalk, vitaminer og tilskud Læs mere: Køb af dyr: opdræt, vildfang og transport

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Pantherophis guttatus tåler regelmæssig håndtering bedre end de fleste krybdyr og bliver som regel rolig og nysgerrig. Lad et nyt dyr falde til i to uger og spise regelmæssigt, før det håndteres. Start med højst 5 minutter ad gangen, og øg gradvist. Håndtér 1-2 gange om ugen og højst en gang dagligt.

Rør let ved slangen med en papirrulle, eller stryg kroppen med en slangekrog, så slangen ved, at det er håndtering og ikke fodertid. Kom til slangen fra siden, og støt så meget af kroppen som muligt. Tag aldrig fat i halen, og hold hovedet væk fra ansigtet. Vent mindst 48 timer efter et måltid, fordi opkast er farligt og kan være dødeligt. Håndtér heller ikke slangen, når den er i hudskifte med blålige, mælkede øjne. Den ser dårligt og er mere defensiv.

Unger er nervøse og snapper efter det meste, men bidene er svage og ophører som regel med alderen. Arten er solitær og skal holdes alene.

Avl

KØNSMODENHED OG KØNSBESTEMMELSE

Hanner og hunner kan ikke skelnes udefra på unger. Kønsbestemmelsen kræver en sonde eller erfaring med at vende halen, så den bør udføres af en erfaren person eller dyrlæge. Hannen har som regel en længere og tykkere halerod. Kønsmodenhed afhænger mere af størrelse end af alder og indtræffer typisk efter 16-24 måneder, ved en længde på omkring 75 cm eller en vægt på omkring 250 g. Hunnen skal være voksen og i god kondition, før hun sættes i avl.

PARRING

Parringen sker typisk om foråret efter en kølig periode om vinteren. Perioden er ikke nødvendig, men er almindelig i avl: dyrene køles ned til omkring 10-16 °C i 60-90 dage et sted uden forstyrrelser og uden stærkt lys. Derefter varmes de op igen og fodres godt.

Hannen opsøger hunnen via duft og berøring. Flere hanner må ikke sættes sammen, fordi de slås om hunnen. Hunnen skal være i god kondition.

ÆGLÆGNING OG KULD

Hunnen lægger æg en til to måneder efter parringen, som regel i løbet af forsommeren. Kuldet er typisk 10-15 æg, enkelte gange op til 30, og i fangenskab kan en hun lægge to kuld i samme sæson. Æggene er hvide, læderagtige og aflange, omkring 4-6 cm lange.

Giv hunnen en æglæggekasse med fugtig sphagnum eller vermiculite og en åbning, så hun kan grave sig ind og lægge æggene. Flyt æggene til inkubatoren efter lægningen. Hunnen skal have rigeligt foder bagefter, fordi lægningen tapper hende.

INKUBATION

Æggene flyttes til en boks med fugtig vermiculite eller perlit uden at blive vendt, så de ligger i samme stilling som i kassen. Boksen skal have små lufthuller og stå i en inkubator ved 27-28 °C. Substratet skal være jævnt fugtigt.

Æggene klækker efter omkring to måneder, 55-65 dage. Ungerne skærer sig ud med en æggetand. Enkelte unger fra sunde æg kommer ikke igennem den seje skal. Æg, der falder sammen eller bliver mugne, kasseres først, når det er tydeligt, at de er døde.

Læs mere: Inkubation af æg

OPDRÆT AF UNGER

Nyklækkede unger måler 20-35 cm og skifter hud i løbet af de første dage, før de begynder at spise. Hold dem enkeltvis i små, sikre terrarier med tætte skjul, et fugtigt skjul og en vandskål. Unger under et år skal også holdes varme om natten. Tilbyd en lille, nyfødt mus hver 5.-7. dag.

Vej og mål ungerne jævnligt. De vokser hurtigt og er udvoksede efter halvandet til to år. Ungerne må ikke holdes sammen, heller ikke søskende, fordi arten kan æde mindre artsfæller.

Sundhed og typiske fejl

Pantherophis guttatus er hårdfør, og de fleste problemer skyldes forkert varme, fugt eller fodring. De typiske fejl er:

- Overvægt ved for hyppig eller for stor fodring. Vej slangen månedligt, og skær ned, hvis kroppen bliver rund og ryggen forsvinder.
- Opkast, hvis slangen håndteres for tæt på et måltid eller bliver kold. Giv fred i mindst 48 timer efter fodring.
- Dårligt hudskifte med hudrester på øjne og halespids, når luften er for tør. Giv et fugtigt skjul og en vandskål, så slangen kan blødgøre huden.
- Mider, som ses som små sorte prikker i vandskålen og på slangen. De kræver behandling og grundig rengøring af terrariet.
- Luftvejsinfektioner med hvæsende vejrtrækning, slim fra næse og mund eller åbent gab. De skyldes ofte for lav temperatur eller dårlig hygiejne.
- Skader fra varmekilder, der ikke er sikret, eller fra levende bytte.

Et sundt dyr har klare øjne, glat hud og et solidt greb. Kontakt en dyrlæge med erfaring i krybdyr, hvis slangen ikke vil spise i flere uger, taber sig, har problemer med vejrtrækningen eller har ændringer i huden.

Spørg altid dine kloge bekendte

Vejledningen er et godt sted at begynde, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskellige, og meget af det vigtigste lærer man af dem, der har holdt arten i årevis. Tal med en avler, en erfaren holder eller en dyrlæge med forstand på krybdyr og padder, før du anskaffer dyret - og igen, hvis noget ser forkert ud.