herpy

SLANGER

## Checkered Garter Snake

# *Thamnophis marcianus*

*Thamnophis marcianus* er en middelstor, overvejende dagaktiv strømpebåndsslange med et sort skakternet mønster på en grøn til olivenbrun ryg. Den lever i det sydvestlige USA, Mexico og Mellemamerika, næsten altid nær vand, og bliver 45-105 cm. Den er hårdfør og kan holdes på optøede mus, men den er selektiv i sin appetit, kan æde artsfæller og slipper ud gennem de mindste sprækker.

Familie: Colubridae

## SPECIFIKATIONER

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **45-105 cm**<br>total længde inkl. hale |
| Vægt | **30-120 g** |
| Levetid | **7-10 år** |
| Aktiv | **Dag og nat** |
| Levevis | **Jordboende og semi-akvatisk** |
| Biotop | **Halvørken, savanne og vådområde** |
| Sværhedsgrad | **Begynder** |

### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **100 × 50 × 50 cm**<br>L × B × H til 1 voksent dyr |
| Temperatur, dag | **23-27 °C** |
| Hotspot | **29-32 °C** |
| Temperatur, nat | **18-24 °C** |
| Luftfugtighed | **35-60 %** |
| Vand | **Vandskål** |
| UVB | **Anbefalet**<br>Ferguson-zone 2 |
| Vinterhvile | **12-15 °C**<br>8-16 uger |
| Kost | **Hvirveldyr og orme/snegle** |
| Holdes | **Enkeltvis** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Levendefødende** |
| Kønsmoden | **18-24 mdr.** |
| Kuldstørrelse | **6-35 unger** |
| Kuld pr. år | **1-2** |
| Drægtighed | **80-105 dage** |

### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ikke omfattet** |
| EU-bilag | **Ikke omfattet** |
| IUCN | **Ikke truet (LC)** |

Arten er ikke på CITES-listerne, i EU's forordning 338/97 eller på EU's liste over invasive arter, og den er ikke omfattet af forbudslisten for slanger i BEK nr. 1261 af 17.11.2015. Der gælder kun dyrevelfærdslovens almindelige krav. Dyrevelfærd hører under Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV).

## Pasning i korte træk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Der findes kun lidt artsspecifik viden om pasningen af *Thamnophis marcianus*. |
| **TEMPERATUR** | Der skal være en tydelig varmegradient. Solpladsen skal være 29-32 °C målt på overfladen, den kølige ende 23-27 °C og natten 18-24 °C. |
| **LUFTFUGTIGHED OG VAND** | Luftfugtigheden skal ligge på 35-60 %, højest i den kølige ende og om natten. Terrariet skal ikke være vådt, for vedvarende fugt giver blærer på bugen og svamp. |
| **LYS OG UVB** | *Thamnophis marcianus* er dagaktiv og trives med kraftigt dagslys. UVB er ikke strengt nødvendigt, men anbefales og gør ofte slangen mere aktiv. |
| **FODER** | I naturen spiser *Thamnophis marcianus* frøer, tudser, haletudser, små fisk og regnorme. I terrariet er frosne og optøede mus den enkleste kost: de giver fuld næring uden tilskud og mindre ildelugtende afføring. |
| **ADFÆRD OG HÅNDTERING** | *Thamnophis marcianus* er hurtig og opmærksom og bliver som regel rolig, hvis den håndteres jævnligt fra ung. Lad nye dyr falde til i omkring to uger, og begynd først at håndtere dem, når de spiser fast. |
| **OPRINDELIG UDBREDELSE** | USA, Mexico, Belize, Honduras, Nicaragua og Costa Rica. |