herpy

SLANGER

Plains Garter Snake

Thamnophis radix

Thamnophis radix er en slank, stribet strømpebåndsslange fra prærierne og de åbne græssletter i det centrale Nordamerika. Den har en gul eller orange rygstribe og bliver 40-70 cm lang. Den er meget kuldetolerant og føder levende unger. Den er hårdfør og kan holdes på optøede mus, men slipper ud gennem de mindste sprækker.

Familie: Colubridae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**40-70 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Vådområde og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**100 × 50 × 50 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**23-27 °C**
Hotspot	**29-32 °C**
Temperatur, nat	**18-24 °C**
Luftfugtighed	**35-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Vinterhvile	**8-15 °C** 8-16 uger
Kost	**Hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kønsmoden	**24-36 mdr.**
Kuldstørrelse	**5-60 unger**
Kuld pr. år	**1**
Drægtighed	**83-102 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke på CITES-listerne, i EU's forordning 338/97 eller på EU's liste over invasive arter, og den er ikke omfattet af forbudslisten for slanger i BEK nr. 1261 af 17.11.2015. Der gælder kun dyrevelfærdslovens almindelige krav. Dyrevelfærd hører under Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV).

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt artsspecifik viden om pasningen af *Thamnophis radix*. Tallene i dette afsnit og de følgende er lånt fra strømpebåndsslanger i almindelighed, især *Thamnophis sirtalis*, som har samme størrelse, levevis og krav.
TEMPERATUR	Der skal være en tydelig varmegradient. Solpladsen skal være 29-32 °C målt på overfladen, den kølige ende 23-27 °C og natten 18-24 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal ligge på 35-60 %, højest i den kølige ende og om natten. Terrariet skal være tørt, for vedvarende fugt giver blærer på bugen og svamp.
LYS OG UVB	*Thamnophis radix* er dagaktiv og trives med kraftigt dagslys. UVB er ikke strengt nødvendigt, men anbefales.
FODER	I naturen spiser *Thamnophis radix* regnorme, snegle, frøer, tudser, salamandre, fisk og enkelte mus. I terrariet er frosne og optøede mus den enkleste kost: de giver fuld næring og mindre ildelugtende afføring end orme og fisk.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Thamnophis radix* er hurtig og opmærksom, men bliver som regel rolig, hvis den håndteres jævnligt fra ung. Lad nye dyr falde til i omkring to uger, og begynd først at håndtere dem, når de spiser fast.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Canada og USA.