herpy

SLANGER

Common Garter Snake

Thamnophis sirtalis

Thamnophis sirtalis er en slank, dagaktiv og nysgerrig slange med lyse striber langs kroppen. Den lever ved vand fra det sydlige Canada gennem det meste af USA til det nordlige Mexico. Den er hårdfør, holder sig vågen og synlig om dagen og kan leve af optøede mus, men den er en mester i at slippe ud og kræver et helt tæt terrarie.

Familie: Colubridae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**50-100 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**6-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og semi-akvatisk**
Biotop	**Vådområde og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**100 × 50 × 50 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**23-27 °C**
Hotspot	**29-32 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**35-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Vinterhvile	**8-15 °C** 8-16 uger
Kost	**Hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kønsmoden	**18-24 mdr.**
Kuldstørrelse	**10-40 unger**
Kuld pr. år	**1**
Drægtighed	**60-90 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke på CITES-listerne, i EU's forordning 338/97 eller på EU's liste over invasive arter, og den er ikke omfattet af forbudslisten for slanger i BEK nr. 1261 af 17.11.2015. Der gælder kun dyrevelfærdslovens almindelige krav. Dyrevelfærd hører under Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV).

Pasning i korte træk

TERRARIET
En voksen *Thamnophis sirtalis* skal have et terrarie på mindst 100 × 50 × 50 cm (længde × bredde × højde), og en hun over 80 cm skal have 120 × 60 × 60 cm.

TEMPERATUR
Der skal være en tydelig varmegradient. Solpladsen skal være 29-32 °C målt på overfladen, den kølige ende 23-27 °C og natten 18-22 °C. Varmekilden slukkes om natten.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal ligge på 35-60 %, højest i den kølige ende og om natten. Terrariet skal ikke være vådt, for vedvarende fugt giver blærer på bugen.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og trives med kraftigt dagslys. UVB er ikke strengt nødvendigt, men anbefales og gør ofte slangen mere aktiv.

FODER
Thamnophis sirtalis tager andre byttedyr end de fleste slanger: regnorme, fisk og gnavere. Insekter som fårekyllinger og melorme spiser den ikke.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Thamnophis sirtalis er hurtig og nysgerrig og bliver som regel tam, hvis den håndteres jævnligt fra ung. Lad nye dyr falde til i omkring to uger, og begynd først at håndtere dem, når de spiser fast.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Canada, Mexico og USA.