herpy

VARANER

Black Tree Monitor

Varanus beccarii

En lille, sort træboende varan fra Aru-øerne ud for Ny Guinea med gribehale og usædvanligt lange forlemmer, som den bruger som hænder, når den jager. Dyret er nervøst, kræver et højt og varmt terrarie med høj luftfugtighed og er svært at få til at yngle, så det passer kun til en erfaren holder.

Familie: Varanidae Tidligere navn: *Varanus prasinus beccarii; Monitor beccarii* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**80-120 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**220-300 g**
Levetid	**10-17 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**150 × 100 × 150 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**26-30 °C**
Hotspot	**35-40 °C**
Temperatur, nat	**22-24 °C**
Luftfugtighed	**55-70 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter og hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**3 æg**
Inkubation	**157-203 dage** ved 29-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Utilstrækkelige data (DD)**

Arten står som de fleste varaner på CITES liste II og i bilag B til EU's forordning om handel med vilde dyr (338/97). Den er ikke på forbudslisten i bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015 (komodovaran, båndvaran, papuavaran, nilvaran og centralafrikansk nilvaran), så den må holdes af private efter de almindelige regler. Bed sælgeren om dokumentation for dyrets lovlige oprindelse; ved indførsel fra lande uden for EU kræves CITES-papirer.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et voksent dyr skal have et højt terrarie på mindst 150 × 100 × 150 cm (længde × bredde × højde), og større er bedre.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen i terrariet skal ligge omkring 26-30 °C, men må gerne spænde fra 24 til 35 °C på tværs af terrariet. Under en varmelampe skal der være en solplads på 35-40 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden i fangenskab ligger oftest på 55-70 % med spring over dagen. Spray bunden dagligt med frisk vand, så luftfugtigheden stiger, og lad den tørre lidt op igen i løbet af dagen.
LYS OG UVB	*Varanus beccarii* er dagaktiv og bør have UVB-lys. Dokumenterede opsætninger bruger en kombineret varme- og UVB-lampe på 100-160 W over solpladsen, i nogle tilfælde suppleret med filtreret dagslys.
FODER	Arten lever mest af levende insekter. Dokumenteret foder til voksne er kakerlakker (fx *Blaptica dubia*), suppleret med melorme, superorme (*Zophobas morio*), fårekyllinger og larver af rosenbiller (*Pachnoda*).
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Varanus beccarii* er nervøs og bliver let stresset af håndtering. Bid og kløer er en reel risiko: tænderne er lange, kløerne skarpe, og et forskrækket dyr kan også sparke og afføre sig på den, der holder det.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Indonesien.