herpy

VARANER

Golden speckled tree monitor

Varanus boehmei

En slank, sort trævaran med gyldne pletter i V-formede rækker, som kun findes på øen Waigeo ud for New Guinea. Arten er sjælden i fangenskab og dårligt kendt, så pasningen her bygger på tal fra nære slægtninge. Den kræver et stort, højt og fugtigt terrarie, daglig sprøjtning og en holder med erfaring.

Familie: Varanidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**70-90 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**8-12 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**150 × 100 × 150 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**26-30 °C**
Hotspot	**38-45 °C**
Temperatur, nat	**22-25 °C**
Luftfugtighed	**60-90 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**3 æg**
Inkubation	**157-161 dage** ved 29-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Utilstrækkelige data (DD)**

Arten står på CITES liste II og i bilag B til EU's forordning om handel med vilde dyr (338/97), så handel på tværs af grænser kræver de tilhørende dokumenter, og sælgeren skal kunne dokumentere, at dyret er lovligt erhvervet. Arten er ikke blandt de fem varaner, der er forbudt for private i Danmark (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015: komodovaran, båndvaran, papuavaran, nilvaran og centralafrikansk nilvaran), så de almindelige regler i dyrevelfærdsloven gælder.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Varanus boehmei er en klatrer, så højden er vigtigere end gulvarealet. Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 150 × 100 × 150 cm (længde × bredde × højde), og et par skal have mere, gerne omkring 160 × 120 × 180 cm.

TEMPERATUR

Tallene til *Varanus boehmei* er lånt fra *V. beccarii* og andre arter i gruppen. Om dagen skal lufttemperaturen være 24-34 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Arter i *V. prasinus*-gruppen tørrer let ud og er sværere at holde end mange andre varaner.

LYS OG UVB

Varanus boehmei er formentlig dagaktiv og soler sig højt i træerne, så lys er både varme og UVB.

FODER

Slægtninge i gruppen lever mest af insekter og andre hvirvelløse dyr, og det gælder formentlig også *Varanus boehmei*.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Varanus boehmei er lille og let bygget, og et voksent dyr på 70-90 cm har skarpe kløer og kan bide, men skaderne er ikke sammenlignelige med dem fra store varaner.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Indonesien.