herpy

VARANER

Bogert's Monitor

Varanus bogerti

Varanus bogerti er en sort, træboende varan fra øerne ud for Ny Guineas sydøstspids, og den hører til gruppen af trævaraner omkring *Varanus prasinus*. Arten er kun kendt fra en håndfuld museumsdyr og næsten ukendt i fangenskab, så pasningen bygger på de nærmeste slægtninge.

Familie: Varanidae Tidligere navn: *Varanus prasinus bogerti*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**82-94 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Sværhedsgrad	**Ekspert**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 80 × 180 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-34 °C**
Hotspot	**45-50 °C**
Temperatur, nat	**22-25 °C**
Luftfugtighed	**70-95 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter og hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**2-3 æg**
Inkubation	**157-203 dage** ved 29-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står som de fleste varaner på CITES liste II og i bilag B til EU's forordning om handel med vilde dyr (338/97). Den er ikke på forbudslisten i bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015 om forbud mod hold af særlige dyr og må derfor holdes af private efter de almindelige regler, bl.a. dyrevelfærdsloven. Bed sælgeren om dokumentation for dyrets lovlige oprindelse; ved indførsel fra lande uden for EU kræves CITES-papirer.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Varanus bogerti*, og arten er næsten ikke set i fangenskab.
TEMPERATUR	Om dagen skal temperaturen være 24-34 °C og om natten 22-25 °C. Overfladetemperaturen på solpladserne skal være 45-50 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være 70-95 %. Forstøv terrariet flere gange i døgnet med frisk vand, gerne med et automatisk anlæg, og lad bunden tørre lidt op mellem forstøvningerne. Dyrene drikker vanddråber fra blade og grene.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og skal have UVB-lys. Brug en kombineret varme- og UVB-lampe over solpladsen, så dyret kan vælge mellem skygge og lys, og sigt mod Ferguson-zone 2.
FODER	Fodringen er lånt fra *V. beccarii* og *V. prasinus*, der hovedsageligt æder store leddyr.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er formentlig sky og nervøs som andre trævaraner, og håndtering stresser dyret. Bid og kløer er en reel risiko: tænderne er skarpe, kløerne er lange, og et forskrækket dyr kan også afføre sig på den, der holder det.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Papua Ny Guinea.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/varaner/varanus-bogerti