herpy

VARANER

Dumeril Monitor

Varanus dumerilii

Varanus dumerilii er en mørk, kraftigt bygget varan med bred skalle fra regnskov og mangrove i Sydøstasien, og den er specialist i krabber. Den er sky og ses sjældent i naturen, men findes jævnligt i handlen. Voksne dyr bliver omkring en meter lange og kræver et stort, varmt og fugtigt terrarie, så arten passer kun til en erfaren holder.

Familie: Varanidae Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**90-140 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende, jordboende og gravende**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**240 × 120 × 120 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Hotspot	**35-42 °C**
Temperatur, nat	**22-25 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Vanddel**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**4-23 æg**
Kuld pr. år	**1-3**
Inkubation	**163-234 dage** ved 24-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Utilstrækkelige data (DD)**

Arten står på CITES liste II og i bilag B til EU's forordning om handel med vilde dyr (som en del af Varanus spp.). Den er ikke på forbudslisten i bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015 (komodovaran, båndvaran, papuavaran, nilvaran og centralafrikansk nilvaran), så den må holdes af private efter de almindelige regler. Ved køb og salg inden for EU hører der EU-dokumentation til dyret, og CITES-papirer kræves ved indførsel.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Terrariemålene for *Varanus dumerilii* bygger på artens længde og på almindelig praksis for jordlevende varaner.
TEMPERATUR	Artens foretrukne temperaturer er ikke målt, og tallene er et skøn ud fra skovlevende varaner. Dagtemperaturen i terrariet holdes på 27-32 °C, gerne 29-32 °C i luften, og vandet skal være mindst 25 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Arten kommer fra fugtige skove og mangrove, så luftfugtigheden skal være høj: 70-90 %, med bunden fugtig i dybden, men ikke våd og stillestående. Tallene er lånt fra andre regnskovsvaraner.
LYS OG UVB	Arten er mest dagaktiv og bruger sol, så UVB-lys anbefales.
FODER	*Varanus dumerilii* er en krabbespecialist. Kæber og adfærd er bygget til at skille krabber ad: dyret ryster byttet, knækker først klosaksene og benene af ved at bruge underlaget som støtte og knuser til sidst skjoldet.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*V. dumerilii* er sky og forsigtig, men som alle varaner er den et dyr med skarpe kløer, stærke kæber og en hale, der kan bruges som pisk. Bid fra en voksen varan på omkring en meter kan give dybe sår og skal behandles.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Myanmar (Burma), Thailand, Malaysia, Singapore, Brunei og Indonesien.