herpy

VARANER

Pygmy Mulga Monitor

Varanus gilleni

En lille, slank og dagaktiv træklatrer fra Australiens indre ørkenegne. *Varanus gilleni* bliver kun 35-40 cm lang og er en af de mindst krævende varaner, men den har brug for en meget varm solplads, et højt terrarie og en fast rytme med en kølig vinter.

Familie: Varanidae Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**35-40 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**60-80 g**
Levetid	**8-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Ørken og halvørken**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 60 × 90 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**26-30 °C**
Hotspot	**40-60 °C**
Temperatur, nat	**18-20 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 3
Vinterhvile	**18-22 °C** 6-10 uger
Kost	**Insekter og hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-7 æg**
Inkubation	**84-131 dage** ved 26-32 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i bilag B til EU's forordning om handel med vilde dyr. Arten er ikke på forbudslisten i bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015 (komodovaran, båndvaran, papuavaran, nilvaran og centralafrikansk nilvaran), så den må holdes af private efter de almindelige regler. Ved køb og salg inden for EU hører der EU-dokumentation til dyret, og CITES-papirer kræves ved indførsel.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Til et voksent par skal terrariet være mindst 60 × 60 × 90 cm (længde × bredde × højde), og større er bedre. Angivelserne svinger fra 50 × 50 × 90 cm til 60 × 60 × 90 cm for et par. Højden er vigtig, fordi arten klatrer.

TEMPERATUR
Varanus gilleni skal have en meget varm solplads. Overfladetemperaturen på grenen under varmekilden måles med et IR-termometer.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Arten kommer fra tørre egne og skal ikke have høj luftfugtighed. Angivelserne svinger fra et helt tørt terrarie, hvor vand kun tilbydes en dag om ugen, til en luftfugtighed på 50-65 %, hvor bunden fugtes 3-4 gange om ugen.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og soler sig ved høj varme. Angivelserne om UVB svinger: flere generationer er opdrættet sunde uden UV-lys, men et UVB-rør i 10 %-styrken anbefales også.

FODER
Varanus gilleni æder mest små leddyr: fårekyllinger, græshopper, kakerlakker, melorme, edderkopper og andre insekter. I naturen tager den også små firben, især gekkoer, og nogle gange fugleæg.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Varanus gilleni er blandt de roligste varaner. Den er langt mindre hurtig og hidsig end fx *V. acanthurus* og *V. tristis*. Den bider sjældent, og selv dyr, der er lidt flygtige i starten, falder hurtigt til ro.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Australien.