herpy

VARANER

## Kimberley Rock Monitor

# *Varanus glauerti*

En slank, langbenet klippevaran fra Kimberley i det nordvestlige Australien, med mørkt hoved, blågrå øjepletter på ryggen og en hale med skarpe sorte og hvide bånd. *Varanus glauerti* bliver kun 60-80 cm, men den er krævende: den skal have et stort, varmt og højt terrarie med klippeflader og sprækker, og holderen skal have erfaring med UVB, ægudrugning og frygtsomme dyr.

Familie: Varanidae  Udgivet 15. november 2026

### SPECIFIKATIONER

#### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **60-80 cm**<br>total længde inkl. hale |
| Levetid | **15-20 år** |
| Aktiv | **Dag** |
| Levevis | **Træboende og klippeboende** |
| Biotop | **Savanne og klippeterræn** |
| Sværhedsgrad | **Erfaren** |

#### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **150 × 80 × 100 cm**<br>L × B × H til 1 voksent dyr |
| Temperatur, dag | **26-32 °C** |
| Hotspot | **45-55 °C** |
| Temperatur, nat | **18-22 °C** |
| Luftfugtighed | **50-80 %** |
| Vand | **Vandskål** |
| UVB | **Nødvendig**<br>Ferguson-zone 3 |
| Kost | **Insekter og hvirveldyr** |
| Holdes | **Enkeltvis eller parvis** |

#### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Kuldstørrelse | **3-9 æg** |
| Kuld pr. år | **1-4** |
| Inkubation | **104-110 dage**<br>ved 28,5-29,5 °C |

#### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Appendiks II** |
| EU-bilag | **Bilag B** |
| IUCN | **Ikke truet (LC)** |

Arten står på CITES liste II og i bilag B til EU's forordning om handel med vilde dyr, ligesom alle varaner, der ikke er strengere listet. Ved handel og indførsel skal der følge CITES-papirer og EU-dokumenter, der viser lovlig oprindelse. Arten er ikke blandt de fem varaner, der er forbudt for private i Danmark (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), så de almindelige regler om dyrevelfærd gælder.

## Pasning i korte træk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 150 × 80 × 100 cm (længde × bredde × højde). Et par skal gerne have 190 × 100 × 105 cm. Større er bedre, fordi dyret klatrer, løber og har brug for en tydelig temperaturgradient. |
| **TEMPERATUR** | *Varanus glauerti* soler sig meget og skal have varme solpladser. Overfladetemperaturen på solpladsen, målt med IR-termometer, skal være 45-55 °C. |
| **LUFTFUGTIGHED OG VAND** | Luftfugtigheden skal være 50-80 %, gerne 60-80 % til dyr i avl. Angivelserne for sprøjtning svinger fra to gange om ugen til dagligt. Ungerne er mere aktive ved høj fugtighed og bør sprøjtes dagligt. |
| **LYS OG UVB** | Arten er dagaktiv og kræver kraftigt UVB-lys (Ferguson-zone 3). |
| **FODER** | Arten lever mest af insekter. Voksne dyr fodres 3-4 gange om ugen med fårekyllinger, dubia-kakerlakker, græshopper og hornorme, og en gang imellem en halvvoksen mus eller en nyfødt rotteunge. |
| **ADFÆRD OG HÅNDTERING** | Arten er frygtsom og skal vænnes til håndtering langsomt. De første uger efter hjemkomsten skal dyret have fred. |
| **OPRINDELIG UDBREDELSE** | Australien. |