herpy

VARANER

Pygmy Rock Monitor

Varanus kingorum

En af verdens mindste varaner: en rødbrun, mørkplettet klippebeboer fra det nordlige Australien, der bliver 18-40 cm inklusive hale. Den lever af insekter, er dagaktiv og dristig i terrariet og kræver mange snævre skjul, meget varme og en dyb, let fugtig bund at grave i.

Familie: Varanidae Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**18-40 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**8-12 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Klippeboende og jordboende**
Biotop	**Savanne og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Hotspot	**45-50 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**6-10 mdr.**
Kuldstørrelse	**2-4 æg**
Inkubation	**89-126 dage** ved 27-31 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i bilag B til EU's forordning om handel med vilde dyr, så handel kræver de almindelige CITES- og EU-dokumenter. Den er ikke nævnt i bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015 om forbud mod hold af særlige dyr og må derfor holdes af private efter de almindelige regler, bl.a. dyrevelfærdsloven.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et voksent par skal have et terrarie på mindst 90 × 45 × 45 cm (længde × bredde × højde), og større er bedre. Målet er lavt og langt, fordi arten lever på jorden og mellem sten.
TEMPERATUR	Arten kræver meget varme. Under en solplads skal overfladetemperaturen være 45-50 °C, målt med et IR-termometer direkte på stenen eller barken, ikke i luften. Det er kun et lille område.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luften i terrariet kan være forholdsvis tør, omkring 40-60 %, men bunden skal holdes jævnt fugtig. Tilfør små mængder vand til jorden med jævne mellemrum, og hæld ikke vand i store mængder.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og trives bedst med stærkt lys og UVB. Brug en kombination af en varmepære og et UVB-rør, fx et T5-rør på 10-12 % over den varme del af terrariet.
FODER	*Varanus kingorum* lever udelukkende af insekter. Hurtige insekter som fårekyllinger og rødløbende kakerlakker er klart at foretrække frem for langsomme dubia-kakerlakker og melorme.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*V. kingorum* er dristig og aktiv i terrariet og færdes i løbet af dagen ude i det fri, når den har rigeligt med skjul. Den er hurtig og kan springe op i hånden, når den ser føde.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.