herpy

VARANER

Biak Emerald Monitor

Varanus kordensis

Varanus kordensis er en slank, grøn træboende varan med et net af mørke ringpletter, og den lever kun på øen Biak nord for Ny Guinea. Den hører til en gruppe trævaraner, der er kendt for at være svære at holde og avle, og der findes næsten ingen detaljerede pasningstal for netop denne art.

Familie: Varanidae Tidligere navn: *Monitor kordensis; Varanus prasinus kordensis* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**70-90 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**8-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Ekspert**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 80 × 180 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-34 °C**
Hotspot	**45-50 °C**
Temperatur, nat	**22-25 °C**
Luftfugtighed	**75-95 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter og hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**12-24 mdr.**
Kuldstørrelse	**2-5 æg**
Kuld pr. år	**1-3**
Inkubation	**160-190 dage** ved 28-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Utilstrækkelige data (DD)**

Arten er opført på CITES liste II og i bilag B i EU's forordning om handel med vilde dyr, så køb, salg og indførsel kræver de dokumenter, som listningen stiller krav om. Arten er ikke nævnt i bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015 om forbud mod hold af særlige dyr og må holdes efter de almindelige regler, herunder dyrevelfærdsloven.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Pasningen af *Varanus kordensis* er næsten den samme som for de andre grønne trævaraner: et stort, højt terrarie med mange skjul, tykke grene og korkrør. Tallene i dette afsnit er lånt fra den nærtbeslægtede *Varanus beccarii*.

TEMPERATUR

Temperaturerne er lånt fra *Varanus beccarii* og er et forsigtigt udgangspunkt for *Varanus kordensis*. Om dagen skal temperaturen være 24-34 °C og om natten 22-25 °C. Overfladetemperaturen under solpladserne skal være over 45 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden skal være høj, omkring 75-95 %, og bør ikke komme under 75 %. Tørre forhold giver udtørring og problemer med hudskiftet.

LYS OG UVB

Varanus kordensis er dagaktiv og soler sig i trækronerne. Behovet for UVB er ikke kendt for arten, men UVB anbefales. Et terrarie til et par kan belyses med to 75 W og en 150 W metaldamplampe (HQI) samt to halogenspots.

FODER

Varanus kordensis lever mest af insekter. I fangenskab består grundfoderet af fårekyllinger, kakerlakker, græshopper og æg, og kylling, kød, rejer og gnavere gives kun af og til.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Varanus kordensis er så lille, at et bid sjældent er alvorligt, men kløerne er skarpe og kan give dybe rifter, og halen bruges til at gribe med, ikke til at piske. Dyrene er hurtige og sky og flygter hellere end at bide.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Indonesien.